Lorenz Friess

Zusammenfassung

Sei G ein endlicher, ebener, zusammenhängender, schlichter Graph. Die Vielecke von G seien alle bis auf höchstens eins - etwa V^* - Dreiecke, k bezeichne die Anzahl der Ecken von V^*. Dann gibt gibt es mindestens 2^{k-3} vierfarbige Färbungen der Ecken von G, derart, daß Ecken, die durch eine Kante verbunden sind, verschieden gefärbt sind. Diese Färbungen sind auf V^* verschieden.

Abstract

Let G be a finite planar connected graph without loops or multiple edges. All minimal circuits except one - say C^* - are triangles. Let k be the number of vertices of C^*. There are at least 2^{k-3} colorings of the vertices of G with four colors, vertices connected by edges colored differently. These colorings are different on C^*.

Mathematics Subject Classification: 05C15

arXiv:math.CO/0410319 13 Oct 2004

1. Definitionen, Bezeichnungen, Satz

Begriffe, die hier nicht erklärt werden, sind immer im Sinne von WAGNER Graphentheorie [1] zu verstehen. Dieses Buch wird mit [W, Seitenzahl] zitiert.

Im weiteren werden nur ebene, zusammenhängende, schlichte Graphen betrachtet.

In Analogie zum Grad $\gamma(E,G)$ einer Ecke E $\in$ G [W, 11] bezeichne $\gamma(V,G)$ die Anzahl der Kanten eines Weges $V \in G$ [W, 30]. Wenn innerhalb (oder außerhalb) eines geschlossenen Weges V (geschlossener Weg ist ein Kreis) keine Ecke und keine Kante von G liegt, so heißt V Vieleck.
$\gamma(G) = \max \gamma(V)$, V Vieleck von G, heißt der Grad von G. G heißt maximal, wenn $\gamma(G) = 3$, d.h. wenn alle Vielecke von G Dreiecke sind. ("maximal eben" in [W, 106])

Ein Graph G heißt fastmaximal, wenn für alle Vielecke V bis auf höchstens eins (etwa V^*) von G gilt γ(V) = 3. Die Ecken von V^* heißen Randecken von G.

Für ein Rad R bezeichnet der Grad $\gamma(R)$ die Anzahl der Ecken auf dem Rand, also $\gamma(R) = |R| - 1$, die Ecke in der Mitte nennen wir Nabe. R_i bezeichnet das Rad mit $\gamma(R) = i$.
Ein Graph G heißt innen-zusammenhängend (kurz i-Graph) wenn G - {Randecken} zusammenhängend und nicht leer ist (zusammenhängend [W, 32]). (Graph G - Ecke E ist der Graph G ohne E und ohne alle mit E inzidenten Kanten, [W, 22].) Räder sind i-Graphen.

Unter einer n-farbigen Färbung, n $\in$ N eines Graphen G verstehen wir eine Abbildung f der Menge der Ecken von G in { 1, 2, ... , n}. Eine Färbung heißt zulässig, wenn für die Ecken E, E' jeder Kante gilt: f(E) $\neq$ f(E').

4-farbige, zulässige Färbungen werden im folgenden kurz Färbungen genannt, andere Färbungen werden nicht betrachtet.

Satz
Jeder fast-maximale Graph G besitzt mindestens $2^{\gamma(G)-3}$ Färbungen.
Diese unterscheiden sich auf dem Rand von G.

2. Heuristische Überlegung

Versucht man einen maximalen Graphen G zu färben, so beginnt man etwa mit einem Dreieck und färbt dessen Ecken E_1, E_2, E_3 mit den Farben 1, 2 und 3. (Wir benutzen zur Bezeichnung der vier Farben die Ziffern 1, 2, 3 und 4, s. oben.) Mit dieser Festlegung entfällt der Faktor 24 für die Anzahl der Färbungen der von den Permutationen der vier Farben kommt.
Ausgehend von diesem Dreieck - G_3 - färben wir eine weitere Ecke, - E_4 - die mit mindestens zwei Ecken von G_3 verbunden ist. Wir färben weiter (zufällig oder systematisch) eine Ecke nach der anderen. Zweierlei fällt dabei auf:
1. bei vielen Ecken, vor allem am Anfang des Färbens, hat man mehrere Möglichkeiten
2. irgendwann kommt man i. a. in die Lage, daß man eine fünfte Farbe braucht. Letzteres kann man umgehen durch Umfärben einer oder mehrerer bereits gefärbter Ecken. Das bedeutet: man hat bei einer vorangehenden Ecke mit Wahlmöglichkeit "falsch" gewählt.
Wenn es gelingt sich alle Möglichkeiten (beim sukzessiven Färben) zu merken, so wird man - wenn es überhaupt eine (vierfarbige) Färbung des Graphen gibt - diese (und überhaupt alle) finden. Ein solches Vorgehen ist also optimal.

Wir betrachten als Beispiel den Graphen von Fig Heu1.



Fig Heu1

Wir beginnen die Färbung bei einem Dreieck, dem "Basisdreieck". Seine Ecken E_1, E_2, E_3 werden mit 1, 2, 3 gefärbt.

Nun kommt eine Ecke hinzu. Sie soll mit wenigstens zwei Kanten mit den Ecken des Basisdreiecks verbunden sein, Fig Heu2.
Es sind zwei Farben für E_4 möglich: 1 und 4. Wir denken uns den Rand des Graphen orientiert und notieren die Farben der Ecken des Randes in entsprechender Reihenfolge, also:

E_1	E_2	E_4	E_3
1	2	1	3
1	2	4	3

Die fünfte Ecke wählen wir so, daß wir den Teilgraphen Fig Heu3 haben.



Fig Heu2



Fig Heu3



Fig Heu4

Insgesamt sind vier Färbungen möglich:

E_1	E_2	E_4	E_5	E_3
1	2	1	2	3
1	2	1	4	3
1	2	4	1	3
1	2	4	2	3

Die Notierung der Färbungen ist mühsam und unübersichtlich, vereinfacht können wird schreiben für Fig Heu2 (für die möglichen Färbungen):

E_1	E_2	E_4	E_3
		1	
1	2		3
		4	

und für Fig Heu3

E_1	E_2	E_4	E_5	E_3
			2	
		1		
			4	
1	2			3
			2	
		4		
			1	

Es dürfte klar sein wie eine solche Tabelle - wir nennen sie "Färbungsschema" (FS) - zu lesen ist. Es wird sich im weiteren zeigen, daß diese Art die möglichen Färbungen zu beschreiben mehr als nur eine Arbeitserleichterung ist.
Wir setzen die Färbung des Beispiels fort: für den Graph Fig Heu4 ergibt sich das Färbungsschema (daneben alle Färbungen als "normale" Liste)

E_1	E_2	E_4	E_5	E_6		E_1	E_2	E_4	E_5	E_6
			2	4		1	2	1	2	4
		1								
			4	2		1	2	1	4	2
1	2				=					
			2	4		1	2	4	2	4
		4								
			1	2, 4		1	2	4	1	2
						1	2	4	1	4

Die Färbungen der Ecke E_3, die jetzt im Inneren liegt, treten nicht im Färbungsschema auf. Das Färbungsschema beschreibt Färbungen durch Angabe der Farben der Ecken des Randes. Zu diesen Färbungen existieren "Fortsetzungen" nach innen. Wenn wir die (zu verschiedenen Färbungen des Randes möglicherweise verschiedenen) Fortsetzungen nach innen nicht aufschreiben, "vergessen" wir Information, die für die weitere Konstruktion der Färbungen offenbar überflüssig ist. (Mit diesen inneren Ecken werden keine weiteren Ecken mehr durch Kanten verbunden und daher bedeuten ihre Farben keine Bedingungen für die weiteren Ecken.)
Bemerkung: G wird als plättbar vorausgesetzt. Hier wird deutlich, daß diese Voraussetzung wesentlich ist.

Nach Anschluß von E_7 haben wir als FS (und in der rechten Hälfte alle Färbungen als Liste):

E_1	E_2	E_7	E_5	E_6	E_1	E_2	E_7	E_5	E_6
		4, 3	2	4	1	2	4	2	4
					1	2	3	2	4
		3	4	2	1	2	4	2	4
1	2								
		1, 3	2	4	1	2	1	2	4
					1	2	3	2	4
		3	1	2, 4	1	2	3	1	2
					1	2	3	1	4

Das FS beschreibt 4 + 3 Färbungen! Davon sind jedoch zwei gleich.
Die Ecke E_4 fällt nach innen, es gibt keine Spalte von E_4 im FS.
Das FS wird komplizierter. Wir lösen das daraus resultierende Problem folgendermaßen: wir schließen nicht eine Ecke (hier E_7) und danach noch eine Ecke (hier E_8) an, sondern das Rad um E_7 mit den Ecken $E_{2,}E_{4,}E_{5,}E_8$, mit $f(E_7) = 3$, dessen FS (des Rades) wir ja bereits kennen, dann die Kante E_8E_6, dann die Kante E_8E_1.
Diese Vorgehensweise wird unten als Anschluß Rad und Anschluß Kante beschrieben.



Fig Heu5

Als FS haben wir (Fig Heu5):

E_1	E_2	E_8	E_5	E_6
			2	4
		1		
			4	2
1	2			
			2	4
		4		
			1	2, 4

Mit der Kante E_8E_6 (E_5 fällt nach innen):

E_1	E_2	E_8	E_6
		1	4, 2
1	2		
		4	2

Mit der Kante E_8E_1 (E_6 fällt nach innen):

E_1	E_2	E_8
1	2	4

3. Weitere Bezeichnungen

Länge einer Ecke E

Zur Vereinfachnung der Ausdrucksweise wird mit der Länge einer Ecke E auf dem Rand eines fm Graph die Länge der Spalte von E im FS bezeichnet.

Anschluß einer Ecke E

Beim Anschluß einer Ecke E an einen Graph G sei ihr relativer Grad >= 2, d.h. sie wird mit (mindestens) zwei Kanten mit G verbunden. (Relativ deshalb, weil der Grad von E durch weiter Anschlüsse noch größer werden kann.)

Anschluß Rad, Anschluß fm Graph

Unter dem Anschluß eines Rades R an einen Graphen G verstehen wir die Identifikation von Randecken des Rades mit Randecken von G wie es aus den Beispielen genau hervorgeht. Wir schreiben dafür z. B. H = G + R.
Der Anschluß eines fm Graphen G’ an einen fm Graphen G bedeutet ganz analog die Identifikationen von Ecken (nicht unbedingt alle Ecken!) der Ränder der beiden Graphen, Schreibweise H = G + G’. (Wieviele Ecken der Ränder von G, G’ geht später aus dem Zusaamhang hervor.)
Wichtig ist, daß die Randecken von beiden Graphen "lückenlos" identifiziert werden, dann ist nämlich der Graph, der durch diese Anschlüsse entsteht, fast-maximal.

Zu einem fm Graph G denken wir uns ein Dreick als Basisdreieck gewählt, das ist ein Dreieck, von dem genau eine Seite auf dem Rand von G liegt. Das FS beginnt mit diesem Dreieck wie in Abschnitt 2 erläutert. D. h. die Ecken der Basisseite haben die Länge 1, die weiteren Ecken sind dann jeweils doppelt so lang bis auf die zwei letzten (auf dem Rand), die gleich lang sind.

4. Definitionen gewisser Klassen von Graphen

K_1 = { G | G ist Rad, | G | ≥ 4 }

K_2 = { G | G_1 + Rad, $G_1 \in K_1$, G ist ein fm i-Graph }

K_n = { G | G_{n-1} + Rad, $G_{n-1} \in K_{n-1}$, G ist ein fm i-Graph }

Bemerkung: Damit $G = G_n$ + Rad ein fm i-Graph ist, wird das Rad mit mindestens 3 Ecken an G_n angeschlossen. (siehe auch Abschnitt 11.)

K_n^* = { $G = G_n$ + "erlaubter Anschluß", $G_n \in K_n$ }

Erlaubter Anschluß ist Anschluß eines Bogens gemäß Abschnitt 8, Anschluß einer Ecke gemäß Abschnitt 9, Anschluß einer Kante gemäß Abschnitt 10.
(Auch mehrere Anschlüsse an verschiedenen Stellen des Randes von G, nicht überschneidend.)

Sei $K = \bigcup_n K_n^*$

Wir beweisen zunächst den Satz für $G \in K$ und betrachten danach fm Graphen $G \notin K$.

Färbungsschema für R_5, FS(R_5), siehe Fig Heu4

E_1	E_2	E_4	E_5	E_6	Färbungen
			2	4	1 2 1 2 4
		1			
			4	2	1 2 1 4 2
1	2				
			2	4	1 2 4 2 4
		4			
			1	2, 4	1 2 4 1 2 und 1 2 4 1 4

Für E_3 gibt es keine Spalte im FS da diese Ecke innen liegt, d.h. nicht auf dem Rand von G.

Es folgen die FS für R_6 und für R_7.

FS(R_6)

E_1	E_2	E_4	E_5	E_6	E_7								
				1	4, 2								
			2										
				4	2								
		1											
				1	2, 4								
			4										
				2	4								
1	2												
				4	2			1	2			1	4
			2				2				4		
				1	4, 2			4	1, 2			2	1, 4
		4				= 1				= 1			
				4	2			1	2			1	4
			1				4				2		
				2	4			2	1			4	1

Hinter "=" steht der Block nach Permutation(1, 4), dann (2, 4) für spätere Erklärung.

Die Spalte "Block" gehört nicht zum FS sondern wird zur Erläuterung verwendet. (Es ist $f(E_1) = 1$, $f(E_2) = 2$.)

E_4	E_5	E_6	E_7	E_8	Block						
			2	4			1	4		2	1
		1				2			4		
			4	2			4	1		1	2
	2				I = 1			= 2			
			2	4			1	4		2	1
		4				4			1		
			1	2, 4			2	1, 4		4	2, 1
1											
			4	2							
		1									
			2	4							
	4				II = I						
			4	2							
		2									
			1	4, 2							
			2	4							
		4									
			1	2, 4							
	2				III = I						
			2	4							
		1									
			4	2							
4											
			1	2, 4			2	1, 4		4	1, 2
		4				4			2		
			2	4			1	4		1	2
	1				IV = 2				= 4		
			1	4, 2			2	4, 1		4	2, 1
		2				1			1		
			4	2			4	1		2	1

Es gibt also (nach Permutation, Zeilen vertauschen) nur zwei Blocktypen, I und IV, für gekoppelte Spalten.

Wenn wir in den längsten Spalten, also zu E_7 und E_8, die jeweils paarweise auf naheliegende Weise zusammengehörenden Farben betrachten ("2-Block"), stellen wir fest, daß es nur folgende "Typen" gibt:

$$\begin{array}{ccc} & 2 & 4 \\ 1 & & \\ & 4 & 2 \end{array} \quad , \quad \begin{array}{ccc} & 1 & 4,2 \\ 2 & & \\ & 4 & 2 \end{array} \quad , \quad \begin{array}{ccc} & 2 & 4 \\ 4 & & \\ & 1 & 2,4 \end{array}$$

Nach Permutation der Farben (und geeigneter Reihenfolge der Zeilen) also nur zwei Typen.

Wir stellen fest: in den letzten drei Spalten eines FS eines Rades treten nur Blöcke auf der Form:

$$\begin{array}{ccc} & 2 & 4 \\ 1 & & \\ & 4 & 2 \end{array} \quad , \quad \begin{array}{ccc} & 1 & 4,2 \\ 2 & & \\ & 4 & 2 \end{array}$$

Von den (analog gebildeten) vier 4-Blöcken, Block I bis IV im FS oben, sind die ersten drei gleich (nach Permutation, geeignete Reihenfolge der Zeilen), d.h. es gibt zwei Typen von 4-Blöcken. Diese Blöcke finden wir auch schon im FS(R_6).

Als Beispiel zeigen wir Block III = Block II:

$$\begin{array}{ccc} & 2 & 4 \\ 4 & & \\ & 1 & 2,4 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & 4 & 2 \\ 2 & & \\ & 1 & 4,2 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & 4 & 2 \\ 1 & & \\ & 2 & 4 \end{array}$$

$$2 \quad = \quad 4 \quad = \quad 4$$

$$\begin{array}{ccc} & 2 & 4 \\ 1 & & \\ & 4 & 2 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & 4 & 2 \\ 1 & & \\ & 2 & 4 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & 4 & 2 \\ 2 & & \\ & 1 & 4,2 \end{array}$$

Für die Räder R_8, R_9, ... gibt es offenbar jeweils ganz analog ein FS. Es kommen auch nur dieselben Blöcke vor. (Das ist leicht einzusehen: die obere Hälfte von FS(R_6) ist gleich Block IV, die untere Hälfte von FS(R_6) ist gleich Block I, durch eine weitere Ecke (E_8, FS(R_7)) erhalten wir zu Block IV zweimal Block I, zu Block I erhalten wir Block I und Block IV. Genauso liefert eine weitere Ecke (E_9, FS(R_8)) wieder entsprechende Blöcke im FS(R_8).)

Die FS können wir auch mit der anderen Orientierung bilden, d.h. die Ecken des Randes in umgekehrter Reihenfolge färben. Außerdem können wir das Basisdreieck beliebig wählen. (Wegen der Symmetrie des Rades trivial.)

Die Anzahl der verschiedenen Färbungen (auf dem Rand verschieden, es existiert eine Fortsetzung nach innen) beträgt $2^{\gamma(G)-3}$ (mindestens).

Bemerkung: Die Anzahl der Färbungen ist $\geq 2^{\gamma(G)-3}$. Diese zusätzlichen Färbungen haben wir da, wo bei einem Element eine zweite Farbe eingetragen ist. Diese Färbungen werden bei der Anzahlangabe nicht mehr erwähnt.

Anfügen einer Kante von E_i nach E_{i+2}, i= 4, ..., $\gamma(G)-2$ liefert ein FS mit halber Länge und im übrigen wieder mit denselben Eigenschaften. Dazu betrachten wir als Beispiel FS(R_6) und verbinden E_4 mit E_6. Färbungen, für die die Ecken E_4 und E_6 die gleiche Farbe haben, sind unzulässig und entfallen, als FS haben wir:

E_1	E_2	E_4	E_5	E_6
			2	4
		1		
			4	2
1	2			
			1	4, 2
		4		
			2	4

also gleich FS(R_5).

Der Anschluß einer solchen Kante ist trivial (im Sinne des Färbungsproblems), da eine innere Ecke vom Grad 3 entsteht. Dies dient nur als Illustration der Eigenschaften von FS. Wenn wir - als weiteres Beispiel - eine Kante von E_5 nach E_7 anfügen erhalten wir als FS:

E_1	E_2	E_4	E_5	E_7	(Perm)	E_1	E_2	E_4	E_5	E_7
			2	4					4	2
		1						1		
			4	2					2	4
1	2				(2, 4)	1	4			
			2	4					4	2
		4						2		
			1	2, 4					1	4, 2

also FS(R_5). Dazu noch die Kante von E_2 nach E_5 gibt das FS

E_1	E_2	E_5	E_7
		4	2
1	2		
		1	4, 2

Das ist gleich dem FS von R_4.

Da man sich ein FS aus Blöcken - wie oben dargestellt - zusammengesetzt denken kann, braucht man sich für das Anfügen einer Kante von einer Ecke zur übernächsten Ecke nur anzusehen was mit den Färbungen, die durch diese Blöcke beschrieben werden, passiert: die Färbungen können wieder durch die Blöcke beschrieben werden.

Es dürfte klar sein, was unter zusammengehörenden Blöcken zu verstehen ist: zwei Blöcke gehören zusammen, wenn sie in der vorherigen Spalte zu demselben Element gehören.

Wir betrachten nochmal $FS(R_7)$ und den Fall, daß eine Kante von E_5 nach E_7 angefügt wird. Als FS haben wir dann:

E_1	E_2	E_4	E_5	E_7	E_8	(Perm)	E_4	E_5	E_7	E_8
				4	2					
			2							
				1	2, 4					
		1								
				2	4					
			4							
				1	4, 2					
1	2									
				1	4, 2				2	4, 1
			2					1		
				4	2				4	1
		4				(1, 2)	4			
				2	4				1	4
			1					2		
				4	2				4	1

Aus Typ I und Typ I wird Typ IV, aus Typ I und Typ IV wird Typ I.

Typ IV tritt nur zusammen mit Typ I auf, d. h. nur in FS mit entsprechend großer Anzahl an Färbungen. (s. Abschnitt 6)

FS_1

Zu jeder Ecke des Randes eines fm Graphen gehört eine Spalte im FS. Die Reihenfolge der Spalten entspricht der Reihenfolge der Ecken auf dem Rand des Graphen. Die Ecken der Basisseite haben die Länge 1. Es gibt eine dritte Spalte der Länge 1 ($\gamma(G) = 3$) oder die beiden letzten Spalten sind gleich lang und haben die Länge $2^{\gamma(G)-3}$ (mit 2 Farben auf einigen Positionen, vgl. Blöcke für gekoppelte Ecken). Diese beiden Ecken bzw. Spalten nennen wir gekoppelte Ecken bzw. gekoppelte Spalten.

FS_2

In einem FS gibt es nur 4-Blöcke der folgenden Typen (vgl. Abschnitt 5) (Für $\gamma(G) = 4$ nur 2-Block.)

		1				1	4			1	2, 4
	2				2				4		
		4				4	1			2	4
1				1				1			
		1				1	4			1	4, 2
	4				4				2		
		2				2	1, 4			4	2
	Bl1					Bl2				Bl3	

FS_3

Zu jedem Element in einer Spalte gehört auf naheliegende Weise ein Teil-FS ("Element" ist selbsterklärend). Dies wird an nachstehendem FS erläutert.

E_1	E_2	E_3	E_4
			2
		1	
			4
	2		
			2
		4	
			1
1			
			4
		1	
			2
	4		
			4
		2	
			1

zu "2" in der Spalte von E_2 gehört

E_2	E_3	E_4
		2
	1	
		4
2		
		2
	4	
		1

und zu "4" in Spalte E_3 gehört

E_3	E_4
	2
4	
	1

jeweils mit den entsprechenden Teilen aller weiteren Spalten - soweit vorhanden.

Das FS oben besteht aus Bl1 für die Spalten von E_1, E_2, E_3, dann zweimal Bl2 für E_2, E_3, E_4.

Zum Ende dieses Abschnitts eine Übersicht, alle Formen von Typ I und Typ IV die man durch Permutation der Farben erhält, jeweils nur eine der möglichen Reihenfolgen der Zeilen.

Typ I

Nr.						Nr					
				1	4					1	2
		2						4			
				4	1					2	1
1	1					2	1				
				1	4					1	2
		4						2			
				2	1, 4					4	1, 2
				2	4					2	1
		1						4			
				4	2					1	2
3	2					4	2				
				2	4					2	1
		4						1			
				1	2, 4					4	2, 1

		1						2			
			2	4					1	4	
5	4					6	4				
			4	2					4	1	
		2						1			
			1	4, 2					2	4, 1	

Typ IV

Nr.						Nr					
			1	4, 2					1	2, 4	
		2						4			
			4	2					2	4	
1	1					2	1				
			1	2, 4					1	4, 2	
		4						2			
			2	4					4	2	
			2	4, 1					2	1, 4	
		1						4			
			4	1					1	4	
3	2					4	2				
			2	1, 4					2	4, 1	
		4						1			
			1	4					4	1	
			4	2, 1					4	1, 2	
		1						2			
			2	1					1	2	
5	4					6	4				
			4	1, 2					4	2, 1	
		2						1			
			1	2					2	1	

Nach Vertauschen von Zeilen sind 1=2, 3=4, 5=6.

Die Blöcke Typ I, 1 bis 6 werden mit B1, ..., B6 bezeichnet.
Die Blöcke Typ IV, 1 bis 6 werden mit C1, ..., C6 bezeichnet. (Siehe Abschnitt 5.)

Blöcke):

A1	A2	A3
2	1	1
1	2	4
4	4	2
2	1	1
2	1	1
4	4	2
1	2	4
1	2	4
4	4	2
1	2	4
2	1	1
4	4	2
4	4	2
2	1	1
1	2	4

Zur Erläuterung die Blöcke in umgekehrter Orientierung:

A1	A2	A3
2	1	1
1	2	4
4	4	2
2	1	1
2	1	1
4	4	2
1	2	4
1	2	4
4	4	2
1	2	4
2	1	1
4	4	2
4	4	2
2	1	1
1	2	4

Bemerkung: aus der Struktur der Blöcke ergibt sich, wie ein FS aufgebaut sein kann.

Zur Schreibweise: aus typographischen Gründen schreiben wir manchmal A1 statt A_1, A2 statt A_2 usw. auch für B1, ..., C1, ...

Die Blöcke A_i sind beschreibbar durch

$$\begin{array}{ccc} & A_1' & \\ & 1 & \\ 2 & & 4 \\ & 4 & \\ 1 & & 2 \\ & 1 & \\ 4 & & 2 \\ & 2 & \end{array} \quad , \begin{array}{ccc} & A_2' & \\ & 2 & \\ 1 & & 4 \\ & 4 & \\ 4 & & 2 \\ & 2 & \\ 2 & & 1 \\ & 1 & \end{array} \quad , \begin{array}{ccc} & A_3' & \\ & 4 & \\ 2 & & 1 \\ & 2 & \\ 4 & & 2 \\ & 1 & \\ 2 & & 1 \\ & 1 & \end{array}$$

dies soll so dargestellt werden:

$$A_1 = \begin{array}{ccc} & A_2' & \\ A_1' & & \\ & A_3' & \end{array} \qquad A_2 = \begin{array}{ccc} & A_1' & \\ A_2' & & \\ & A_3' & \end{array} \qquad A_3 = \begin{array}{ccc} & A_1' & \\ A_3' & & \\ & A_2' & \end{array}$$

Die Blöcke B_i, C_i kommen nur am Ende eines FS vor, haben also keine Nachfolger. Zu A_1 sind als Nachfolger möglich:

$$A_1 \begin{array}{c} B_3, B_4, C_3 \\ \\ B_5, B_6, C_5 \end{array}$$

Tatsächlich gibt es aber nicht alle neun Kombinationen. Die Kopplung der Spalten in B_i, C_i entsteht ja dadurch, daß eine Farbe "verboten" ist (durch eine Kante zu einer Ecke der Länge 1), diese verbotene Farbe ist für beide Blöcke dieselbe, also gibt es nur:

$$A_1 \begin{array}{c} B_3 \\ \\ B_5 \end{array} , A_1 \begin{array}{c} B_4 \\ \\ C_5 \end{array} , A_1 \begin{array}{c} C_3 \\ \\ B_6 \end{array}$$

Für A_2, A_3 findet man entsprechend:

$$A_2 \begin{array}{c} B_1 \\ \\ C_1 \end{array} , A_2 \begin{array}{c} B_2 \\ \\ B_4 \end{array} , A_2 \begin{array}{c} C_1 \\ \\ B_3 \end{array}$$

$$A_3 \begin{array}{c} B_1 \\ \\ C_3 \end{array} , A_3 \begin{array}{c} B_2 \\ \\ B_4 \end{array} , A_3 \begin{array}{c} C_1 \\ \\ B_3 \end{array}$$

Für A_1, A_2, A_3

$$A_1 \begin{array}{c} A_2 \\ \\ A_3 \end{array} , A_2 \begin{array}{c} A_3 \\ \\ A_1 \end{array} , A_3 \begin{array}{c} A_1 \\ \\ A_2 \end{array}$$

Graphen R (Ecken vom Rand) identifiziert, so ist dies zulässig nur möglich, wenn es passende - d. h. gleiche - Färbungen gibt. Ob dies der Fall ist hängt ab von den Blöcken, die die Färbungen dieser Ecken beschreiben. Die Ränder von G und R sind entgegengesetzt orientiert.

Liste der Kombinationen von Blöcken mit passender Färbung - soweit vorhanden - als Beispiel. Bei jeder Kombination hat man sich die beiden Blöcke mit entgegengesetzter Orientierung zu denken:

Tabelle 4-4

	A1	A2	A3
A1	1 2 4 1	2 1 4 1	4 2 1 2
A2		2 1 4 2	2 4 2 4
A3			4 2 1 4

	B1	B2	B3	B4	B5	B6
A1	1 4 2 1	1 2 4 1	-	2 1 2 1	-	4 1 4 1
A2	-	1 4 1 2	2 4 1 2	2 4 1 2	4 1 4 2	-
A3	1 4 1 4	-	2 1 2 4	-	4 2 1 4	4 2 1 4
B1	1 4 2 1					
B2	1 4 2 1	1 2 4 1				
B3	-	-	2 1 4 2			
B4	-	2 4 2 1	2 1 4 2	2 4 1 2		
B5	-	-	4 1 4 2	-	4 2 4 2	
B6	4 2 4 1	-	-	-	4 1 2 4	4 1 2 4

	C1	C3	C5
A1	-	2 1 2 1	4 1 4 1
A2	1 2 1 2	-	4 2 4 2
A3	1 4 1 4	2 4 2 4	-
B1	-	-	1 2 1 4
B2	-	1 4 1 2	-
B3	-	-	2 1 2 4
B4	2 4 2 1	-	-
B5	-	4 2 1 2-	
B6	1 4 2 4	-	-
C1	-		
C3	1 2 1 2	-	
C5	1 4 1 4	2 1 2 4	-

Kombinationen für die "-" eingetragen ist, können nicht zur Konstruktion des FS(G+R) verwendet werden, da keine passenden Färbungen für die Ecken existieren.

Tabelle der Blöcke und passende Farbungen für drei gemeinsame Spalten.

Tabelle 3-3

	A1	A2	A3			
A1	2 1 2					
A2	4 2 4	1 2 1				
A3	2 4 2	1 2 1	1 4 1			
	B1	B2	B3	B4	B5	B6
A1	2 1 4	2 1 2	4 1 2	4 1 2	1 4 2	1 2 4
A2	4 2 1	4 2 1	1 2 4	4 2 1	1 2 4	2 4 1
A3	2 4 1	4 2 1	1 4 2	4 2 1	1 4 2	2 4 1
B1	4 1 4	2 1 4	1 4 2	2 1 4	2 4 1	4 2 1
B2		2 1 2	1 2 4	1 4 2	1 4 2	4 2 1
B3			4 2 4	1 2 4	4 1 2	1 4 2
B4				1 2 1	4 2 1	4 2 1
B5					2 4 2	1 4 2
B6						1 4 1
	B1	B2	B3	B4	B5	B6
C1	4 1 4	2 1 2	4 2 4	4 1 2	2 1 2	2 1 4
C3	4 2 1	4 2 1	1 2 4	1 2 1	1 2 4	1 2 4
C5	2 4 1	2 1 2	1 4 2	1 2 1	1 2 4	1 2 4
	C1	C3	C5			
A1	2 1 2	1 2 4	2 1 2			
A2	4 2 4	1 2 1	1 2 1			
A3	2 1 2	1 4 1	2 1 2			
	C1	C3	C5			
C1	2 1 2	4 2 4	2 1 2			
C3		1 2 1	1 2 1			
C5			1 2 1			

Genauso erhält man noch eine Tabelle für Blöcke mit zwei gemeinsamen Spalten.

7. Anschluß Rad an fm Graph

In den folgenden Abschnitten ist G - soweit nicht anders definiert - ein fm Graph mit FS.

In diesem Abschnitt betrachten wir den Anschluß eines Rades R an einen fm Graph G mit FS. Mit Anschluß R(n, k) bezeichnen wir den Anschluß eines Rades R mit $\gamma(R) = n$, wobei k Ecken von R mit Randecken von G identifiziert werden. Es sind nur R(n, k) mit k ≥ 3 von Interesse (sonst ist G + R kein i-Graph).
Für die Fälle R(n=2k-2, k) gibt es eine spezielle besonders einfache Konstruktion des FS(G+R), s. unten Fall m = k. In diesen Fällen ist $\gamma(G) = \gamma(G + R)$.

Gegeben sei ein fm Graph G mit Färbungsschema FS. Den Graph G stelle man sich in FigRad "unter" E_{g_1} , E_{g_2} , ... $E_{g_{k-1}}$, E_{g_k} vor, E_1, E_n sind durch eine Kante verbunden.
An G wird ein Rad R angeschlossen. Behauptung: es gibt ein FS für G + R.
Beweis durch Konstruktion des FS(G+R).



FigRad

Bezeichnungen:
E_1 , ..., E_n die Ecken vom Rand von G, E_1E_2 Basisseite von G, E_nE_{n-1} gekoppelte Spalten von G; E_{r_1}, ..., $E_{r_{m+k}}$ die Ecken vom Rand von R, $E_{r_2}, \ldots, E_{r_{m-1}}$ die Ecken von R, die nicht mit Ecken von G identifiziert werden, E_{r_1}, ..., E_{r_m} die Ecken von R, die auf dem Rand von G + R liegen, also $\gamma(R) = m + k - 2$. E_{g_1}, ..., E_{g_k} bezeichnen die Ecken von G, die mit Ecken von R identifiziert werden, nämlich E_{r_1} mit E_{g_1}, $E_{r_{m+i}}$ mit $E_{g_{k-i}}$, i=2,...,k-2.

R wird mit $k \geq 3$ Ecken an G angeschlossen (für $k \leq 2$ ist der entstehende Graph kein i-Graph). $m \geq 2$, m = 2 bedeutet Kante von E_{r_1} nach E_{r_2}. Es gilt: γ (G + R) = γ (G) + (m-2) - (k-2) = $\gamma(G) + m - k$.

Bemerkung zum Fall m = k.
Wir betrachten zuerst kurz den speziellen Fall m = k. Er ist besonders einfach - dies ist für den weiteren Beweis jedoch ohne Bedeutung.

In diesem Fall wählen wir $f(E_z) = 3$ und $f(E_{r_i}) = f(E_{g_i}), i = 2, \ldots, k-1$, d.h. wir haben wieder dasselbe FS: FS(G+R)=FS(G).

Bevor wir andere Wertepaare für m, k betrachten geben wir eine Übersicht der Beweisschritte:

Gegeben ist der fm Graph G mit FS(G), anzuschließen ist das Rad R.
Das FS für den fm Graph G+R erhalten wir so:
Die Basisseite von G+R sei die von G und für die Randecken E_1 bis E_{g_1} wählen wir das FS von G, d. h. den entsprechenden Teil des FS von G.
Wir wählen E_{g_1} und E_{g_2} als Ecken der Basisseite von R (die Basisseite ist frei wählbar).
Für die Ecken von R, die auf dem Rand von G + R liegen, (die "neuen" Randecken außer E_{g_1}, E_{g_k}) wählen wir das TeilFS bestehend aus den Spalten zu $E_{r_1}, \ldots, E_{r_m}$ vom FS(R) und setzen damit das FS(G+R) zu **jedem** Element von E_{g_1} fort.
Für die Ecken E_{g_k} und darüber verwenden wir wiederum Teilschemata vom FS(G) (evtl. mehrfach benutzt: trotzdem sind die Färbungen im FS von G+R alle verschieden: sie unterscheiden sich auf $E_{r_2}, \cdots E_{r_{m-1}}$.)
Mit jeder Ecke von R, die auf dem Rand von G + R liegt, wird die Anzahl der Färbungen verdoppelt, danach mit jeder Ecke von G die nach innen fällt die Anzahl der Färbungen halbiert. (Die genaue Anzahl liefert das FS.)

Zu zeigen: das Rad kann "verträglich" an G angeschlossen werden, d. h. es gibt in FS(G) und in FS(R) für die Ecken, die identifiziert werden, gleiche ("passende") Farben. Dies geschieht unter Verwendung der Blöcke aus denen man sich die FS von G und R aufgebaut denken kann.
Als Spezialfälle muß auf die Lage der gekoppelten Spalten eingegangen werden, z. B. wenn die gekoppelten Spalten von G nach innen fallen, d. h. mit Ecken von R identifiziert werden, oder wenn k=3, dann liegen die gekoppelten Spalten von R beide auf dem Rand von G+R.

Die Konstruktion des FS von G + R im einzelnen.
Bezeichnung: $E_x < E_y$ soll bedeuten E_x liegt im Sinne der Orientierung des Randes von G (oder R) vor E_y.
Der Anfang der Konstruktion ist immer gleich: es wird für E_1 bis E_{g_1} das FS von G als (Anfang des) FS von G+R übernommen.
Wir unterscheiden bei der weiteren Konstruktion die Lage der gekoppelten Spalten, da für diese die Blöcke anders aufgebaut sind als im übrigen FS.

Es folgt eine Reihe von Fallunterscheidungen.
Zuerst als Beispiel der Fall k > 4, m > 4.
Die gekoppelten Ecken $E_{r_{m+k-3}}$, $E_{r_{m+k-4}}$ von R werden identifiziert mit E_{g_3}, E_{g_4}.

Sei zunächst $E_{n-1} > E_{g_k}$.

Die Basisseite von G + R sei die von G. Für die Basisseite und die Randecken bis E_{g_1} wählen wird das FS von G. Für jedes Element der Spalte von E_{g_1} und den beiden dazugehörenden Elementen der Spalte von E_{g_2} haben wir ein FS von R mit E_{g_1}, E_{g_2} (= E_{r_1}, $E_{r_{k+m-2}}$) als Basisseite.
Für das folgende betrachten wir $f(E_{g_1}) = 1$, dann ist $f(E_{g_2})$ = 2 oder 4, für $f(E_{g_1}) = 2$ und $f(E_{g_1}) = 4$ verlaufen alle Überlegungen analog. Mit diesem FS(R) (Teil-FS bis zur Spalte von $E_{r_{m-1}}$) wird das FS von G + R durch Anhängen an jedes Element von E_{g_1} definiert. Die so definierten Färbungen für G + R (zunächst für die Randecken bis einschließlich $E_{r_{m-1}}$) bilden ein FS für den bis jetzt betrachteten Teil des Randes von G+R.
Haben nun die Färbungen von R Fortsetzungen für E_{r_m}, ..., $E_{r_{m+k-3}}$(= E_{g_3}) derart, daß sie zu den Färbungen von G auf den entsprechenden Ecken passen? (Die möglichen Färbungen auf den Ecken von G liegen fest weil wir das FS von G verwenden für den Anfang des FS von G + R.)

Wir sehen uns die Spalte von $E_{r_{m-1}}$ (im FS von R) an (einen Block, die Argumentation ist für alle Blöcke gleich) diese Spalte ist die letzte, die einfach in das FS(G+R) übernommen ("abgeschrieben") wurde.
Für $E_{r_{m-3}}$, $E_{r_{m-2}}$, $E_{r_{m-1}}$, E_{r_m} liegt Block A_1, A_2 oder A_3 vor. Es kann nur einer dieser drei Fälle vorliegen, welcher es tatsächlich ist, hängt von m ab.
Wir betrachten andererseits einen Block aus dem FS von G, und zwar zu einem Element der Spalte von $E_{g_{k-2}}$.
Er kann - in Abhängigkeit von $f(E_{g_{k-2}})$ - ebenfalls A_1, A_2 oder A_3 sein, und zwar gehört zu $f(E_{g_{k-2}}) = 1$ bzw. $f(E_{g_{k-2}}) = 2$ bzw. $f(E_{g_{k-2}}) = 4$ Block A_1 bzw. A_2 bzw. A_3. Welcher tatsächlich vorliegt hängt von k ab.

Zu den Farben in der Spalte von $E_{r_{m-1}}$ können wir jetzt die Färbung des Randes (die Konstruktion des FS von G + R) fortsetzen indem wir Färbungen des Randes von G verwenden:
Zu $f(E_{r_{m-1}}) = 1$ sind einerseits vom (FS vom) Rad $f(E_{r_m}) = 2$ und $f(E_{r_m}) = 4$ möglich und andererseits - für alle Blöcke A_1, A_2, A_3 aus dem FS von G - sind $f(E_{g_k}) = 2$ und $f(E_{g_k}) = 4$ möglich, und zwar mit den zugehörigen Fortsetzungen vom FS von G (für die Ecken oberhalb E_{g_k}) bis E_n und diese Färbungen unterscheiden sich auf dem Rand (von G + R). Dieselben Fortsetzungen werden mehrfach verwendet!
Zu $f(E_{r_{m-1}}) = 2$ sind einerseits vom FS von R $f(E_{r_m}) = 1$ und $f(E_{r_m}) = 4$ möglich und andererseits - für alle Blöcke A_1, A_2, A_3 aus dem FS von G - sind $f(E_{g_k}) = 1$ und $f(E_{g_k}) = 4$ möglich. (Es kann mehrere Möglichkeiten geben, z. b. $f(E_{g_k}) = 1$ zweimal. Es ist egal welche "1" mit ihren Fortsetzungen verwendet wird, die Fortsetzungen sind gleich, vgl. Abschnitt 5.)
Zu $f(E_{r_{m-1}}) = 4$ sind $f(E_{r_m}) = 1$ und $f(E_{r_m}) = 2$ vom FS von R möglich und andererseits $f(E_{g_k}) = 1$ und $f(E_{g_k}) = 2$ möglich für alle Blöcke vom FS von G.
Damit R so angeschlossen werden kann und das FS für G + R konstruiert werden kann, müssen wir noch zeigen, daß es im FS von R und im FS von G für die Ecken, die jeweils identifiziert werden, passende (d. h. gleiche) Färbungen gibt.
$f(E_{r_m}) = f(E_{g_k})$ haben wir gerade betrachtet, jetzt ist noch $f(E_{r_{m+1}}) = f(E_{g_{k-1}})$, ..., $f(E_{r_{k+m-3}}) = f(E_{g_3})$, $f(E_{r_{k+m-2}}) = f(E_{g_2})$, zu zeigen. D. h. zu dem Vorgänger von E_{g_k}, das ist $E_{g_{k-1}}$ - dessen Farbe steht fest - muß es unter den Fortsetzungen von E_{r_m} auf $E_{r_{m+1}}$ eine passende (d.h. gleiche) Farbe geben usw., also zu zeigen: es gibt Färbungen sodaß $f(E_{r_{m+1}}) = f(E_{g_{k-1}})$, ..., $f(E_{r_{k+m-3}}) = f(E_{g_3})$, $f(E_{r_{k+m-2}}) = f(E_{g_2})$,

Für diese Ecken wird - wie bereits festgestellt - das FS von R durch die Blöcke A_1, A_2, A_3 beschreiben.

Dieselben Blöcke haben wir haben wir im FS von G. Es müssen also zusammenpassen die Blöcke A_1, A_2, A_3 mit einem der drei A_1, A_2, A_3 in umgekehrter Orientierung. Es gibt immer zueinander passende Färbungen gleichgültig welcher Block von G und welcher Block von R zusammenpassen müssen wie man aus der Abschnitt 6, Tabelle 4-4 ersehen kann.
Wir stellen den Sachverhalt nochmal anders dar: haben wir z. B. $f(E_{g_{k-i}}) = f(E_{r_{m+i}})$, i=1, ..., k-4, so ist in FS(G) $f(E_{g_{k-i-1}})$ = 2 **oder** 4 und in FS(G) $f(E_{r_{m+i+1}})$ = 2 **und** 4. Daher gibt es zwei passende Färbungen (zwei gleiche, je eine in FS(G) und in FS(R)).

Diese Konstruktion ist so möglich Spalte für Spalte bis die gekoppelten Spalten von R anzuschließen sind, d.h. für $E_{r_i}, i < m + k - 4$.

Wir betrachten nun die möglichen Blöcke des FS von R für die gekoppelten Spalten. Die gekoppelten Spalten gehören zu den Ecken $E_{r_{m+k-4}}$, $E_{r_{m+k-3}}$.
Welcher Block für R vorliegt hängt ab von $f(E_{g_2})$. (E_{g_2} war als eine Ecke der Basisseite von R gewählt und damit geht $f(E_{g_2})$ in das FS(R) ein.) Es kann $f(E_{g_2}) = 2$ oder $f(E_{g_2}) = 4$ sein. (Wir betrachten $f(E_{g_1}) = 1$.) Damit erhalten wir zwei FS für R. (Zu einem Element von $E_{g_1} = E_{r_{k+m-1}}$ haben wir zwei Elemente in (der Spalte von) $E_{g_2} = E_{r_{k+m-2}}$ und für diese zwei verschiedene FS für R.) Wenn $f(E_{g_2}) = 2$ haben wir im FS von R einen der Blöcke B1, B6, C3. Die entsprechenden Ecken werden mit E_{g_3}, ... identifiert. Für diese Ecken der Block in FS(G) ist A2. Es gibt immer passende Färbungen, Abschnitt 6, Tabelle 3-3.

Wir zeigen dies einmal explizit.

	$E_{r_{m+k-5}}$	$E_{r_{m+k-4}}$	$E_{r_{m+k-3}}$	$E_{r_{m+k-2}}$
	E_{g_5}	E_{g_4}	E_{g_3}	E_{g_2}
		2	4, 1	
	1			
		4	1	
R, C3				2
		2	1, 4	
	4			
		1	4	
	1			
		2		
	4			
			1	
	1			
		4		
	2			
G, A2				2
	4			
		2		
	1			
			4	
	4			
		1		
	2			

Wir stellen fest, daß es zu jeder Färbung von $E_{r_{m+k-5}}$, $E_{r_{m+k-4}}$, $E_{r_{m+k-3}}$, $E_{r_{m+k-2}}$ passende Färbungen der entsprechenden Ecken von G gibt.

E_{g_5}	E_{g_4}	E_{g_3}	E_{g_2}
1	2	1	2
1	2	4	2
1	4	1	2
4	2	1	2
4	2	4	2
4	1	4	2

	$E_{r_{m+k-5}}$	$E_{r_{m+k-4}}$	$E_{r_{m+k-3}}$	$E_{r_{m+k-2}}$
	E_{g_5}	E_{g_4}	E_{g_3}	E_{g_2}
		1	4	
	2			
		4	1	
R, B1				2
		1	4	
	4			
		2	1, 4	
	1			
		2		
	4			
			1	
	1			
		4		
	2			
G, A2				2
	4			
		2		
	1			
			4	
	4			
		1		
	2			

die passenden Färbungen:

2	1	4	2
2	4	1	2
4	1	4	2
4	2	1	2
4	2	4	2

Wir stellen fest, daß es zu jeder Färbung von $E_{r_{m+k-5}}$, $E_{r_{m+k-4}}$, $E_{r_{m+k-3}}$, $E_{r_{m+k-2}}$ passende Färbungen der entsprechenden Ecken von G gibt.

	Er_{m+k-5}	Er_{m+k-4}	Er_{m+k-3}	Er_{m+k-2}
	E_{g_5}	E_{g_4}	E_{g_3}	E_{g_2}
		4	1	
	1			
		2	4, 1	
R, B6				2
		4	1	
	2			
		1	4	

	1			
		2		
	4			
			1	
	1			
		4		
	2			
G, A2				2
	4			
		2		
	1			
			4	
	4			
		1		
	2			

die passenden Färbungen:

1	4	1	2
1	2	4	2
1	2	1	2
2	4	1	2
2	1	4	2

Für $f(E_{g_2}) = 4$ gilt entsprechendes: Blöcke für R sind B2, B4, C3, für G Block A3.

	$E_{r_{m+k-5}}$	$E_{r_{m+k-4}}$	$E_{r_{m+k-3}}$	$E_{r_{m+k-2}}$
	E_{g_5}	E_{g_4}	E_{g_3}	E_{g_2}
		1	2	
	4			
		2	1	
R, B2				4
		1	2	
	2			
		4	1, 2	
	1			
		4		
	2			
			1	
	1			
		2		
	4			
G, A3				4
	2			
		4		
	1			
			2	
	2			
		1		
	4			

die passenden Färbungen:

4	1	2	4
4	2	1	4
2	1	2	4
2	4	1	4
2	4	2	4

	Er_{m+k-5}	Er_{m+k-4}	Er_{m+k-3}	Er_{m+k-2}
	E_{g_5}	E_{g_4}	E_{g_3}	E_{g_2}
		1	2	
	4			
		2	1	
R, B4				4
		2	1	
	1			
		4	2, 1	

	1			
		4		
	2			
			1	
	1			
		2		
	4			
G, A3				4
	2			
		4		
	1			
			2	
	2			
		1		
	4			

die passenden Färbungen:

4	1	2	4
4	2	1	4
1	2	1	4
1	4	2	4
1	4	1	4

	Er_{m+k-5}	Er_{m+k-4}	Er_{m+k-3}	Er_{m+k-2}
	E_{g_5}	E_{g_4}	E_{g_3}	E_{g_2}
		4	2, 1	
	1			
		2	1	
R, C5				4
		4	1, 2	
	2			
		1	2	

	1			
		4		
	2			
			1	
	1			
		2		
	4			
G, A3				4
	2			
		4		
	1			
			2	
	2			
		1		
	4			

die passenden Färbungen:

1	4	2	4
1	4	1	4
1	2	1	4
2	4	1	4
2	4	2	4
2	1	2	4

Für $f(E_{g_1}) = 4$ haben wir im FS(R) einen der Blöcke B2, B4, C5.

		Blöcke FS(R)	Block FS(G)
$f(E_{g_1}) = 1$	$f(E_{g_2}) = 2$	B1, B6, C3	A2
	$f(E_{g_2}) = 4$	B2, B4, C5	A3
$f(E_{g_1}) = 2$	$f(E_{g_2}) = 1$	B3, B5, C1	A1
	$f(E_{g_2}) = 4$	B2, B4, C5	A3
$f(E_{g_1}) = 4$	$f(E_{g_2}) = 1$	B3, B5, C1	A1
	$f(E_{g_1}) = 2$	B1, B6, C3	A2

Wie bereits oben ("Übersicht der Beweisschritte") bemerkt, wird das FS(G+R) für E_{g_k} bis E_n durch die entsprechenden TeilFS(G) zu jedem Element von E_{g_k} fortgesetzt. FS(G+R) hat dann offensichtlich alle Eigenschaften eines FS.

Bemerkung: Bei der Konstruktion des FS von G + R werden nicht immer alle möglichen Färbungen berücksichtigt. Dies entspricht dem Sachverhalt, daß es maximale Graphen gibt mit mehr als einer Färbung. (Hier hat ein maximaler Graph ja nur eine Färbung.)
Wenn man diese nicht berücksichtigten Färbungen untersucht, erhält man Bedingungen dafür, daß ein maximaler Graph mehr als eine Färbung besitzt.

Die Bedeutung der FS und deren Aufbau durch Blöcke ist nun deutlich.

Es folgt die Konstruktion des FS(G+R) mit zahlreichen Fallunterscheidungen. Diese Konstruktionen verwenden als Eigenschaft von R nur, daß es ein fm Graph mit FS ist (mit beliebig wählbarer Basisseite und Orientierung). Der Graph R muß kein Rad sein.

Wir unterscheiden die Konstruktion des FS(G+R) nach der Lage der gekoppelten Ecken von G und R zueinander und ob sie auf dem Rand von G+R liegen.
Es sei erinnert an $E_{g_1} = E_{r_1}$, $\gamma(R) = m + k - 2$, $E_{r_i} = E_{g_{m+k-i}}$, i=m+1, ..., m+k-2.
Mit E_{g_k+1} (nicht $E_{g_{k+1}}$) wir die nächste Ecke auf dem Rand von G bezeichnet. In diesem Abschnitt sei $m \geq 3$. Die Fälle mit m=2 werden extra untersucht.
In den Abbildungen ist die Basisseite verstärkt dargestellt, die Kante zwischen gekoppelten Ecken ist durch eine zusätzliche Strichelung dargestellt. Für $E_{g_1} = E_2$ ist $f(E_{g_1}) = 2$, dann ist $f(E_{g_2}) = 1$ oder 4, die Konstruktion des FS(G+R) kann genauso durchgeführt werden. Die Fälle $E_{g_1} > E_2$, $E_{g_1} = E_2$, müssen erst bei $f(E_{g_n}) = f(E_{g_k})$ getrennt betrachtet werden. Kanten , die gestrichelt sind, können fehlen, dann sind die beiden Ecken natürlich identisch.

1. $E_{n-1} \geq E_{g_k}$, d.h. die gekoppelten Ecken von G liegen auf dem Rand von G+R.

1.1.
$k \geq 4$, $m \geq 4$, d. h. die gekoppelten Ecken von R liegen nicht auf dem Rand von G+R.



$E_{g_1} > E_2$, dieser Fall ist oben ausführlich dargestellt.
Das FS(G) zu den Ecken E_{g_1}, ... E_{g_k} wird beschrieben durch normale Blöcke, also durch A1, A2 oder A3.
Das FS(R) zu den Ecken E_{r_1} bis $E_{r_{m+k-4}}$ d. h. bis zu den gekoppelten Ecken $E_{r_{m+k-4}}$, $E_{r_{m+k-3}}$ wird beschrieben durch normale Blöcke. Also müssen passen A_i, A_j, i, j = 1,2,3. Dies ist immer erfüllt.
Der Block für die Ecken E_{m+k-4}, E_{m+k-3}, die gekoppelten Ecken von R, hängt ab von $f(E_{g_2})$. Sei $f(E_{g_1}) = 1$, dann ist $f(E_{g_2}) = 2$ oder 4 und der Block für G für die Ecken E_{g_1} E_{g_2} E_{g_3} E_{g_4} ist vom Typ A1.
Für $f(E_{g_2}) = 2$ haben wir für R den Block B1 oder B6 oder C3, da $f(E_{g_3} = E_{r_{m+k-3}}) \neq 2$ sein muß.
Den Tabellen entnehmen wir, daß es passenden Färbungen gibt. (Alle Kombinationen von A1, A2, A3 mit B1, B6, C3.)
Für $f(E_{g_2}) = 4$ haben wir für R den Block B2 oder B4 oder C5.
Den Tabellen entnehmen wir, daß es passenden Färbungen gibt.

Für $E_{g_1} = E_2$ ist dieselbe Konstruktion möglich, es ist dabei nur $f(E_{g_1}) = 2$ (= $f(E_2)$) zu beachten.

1.2. k=3, die gekoppelten Ecken von R liegen auf dem Rand von G+R.

1.2.1 m=3. Wir setzen $f(E_{r_2}) = f(E_{g_2})$.

1.2.2 m=4, $E_{g_1} \geq E_2$



Wir betrachten die Lage von E_{g_1}, d. h. ob $E_{g_1} = E_2$ oder $E_{g_1} \neq E_2$:
$E_{g_1} = E_2$ => $f(E_{g_1}) = 2$ => $f(E_{g_2}) = 1$ oder 4
$E_{g_1} > E_2$
$E_{g_1} = E_3$ => $f(E_{g_1}) = 1$ bzw. 4 und $f(E_{g_2}) = 2, 4$ bzw. $f(E_{g_2}) = 1, 2$.
$E_{g_1} > E_3$ => $f(E_{g_1}) = 1, 2$ oder 1, 4 oder 2, 4.
In jedem dieser Fälle gibt es für einen Wert von $f(E_{g_1})$ zwei Werte für $f(E_{g_2})$ und daher mit E_{g_1}, E_{g_2} als Basisseite zwei FS für R.

Damit wir ein FS für G+R erhalten, muß bei der Konstruktion der Block des FS(R), der die Kopplung E_{r_3}, E_{r_4} beschreibt, durch einen Block ohne Kopplung ersetzt werden (in einem FS sind nur die beiden letzten Ecken gekoppelt, in G+R also E_n, E_{n-1} und für diese Ecken haben wir die Kopplung des FS(G+R) per Konstruktion).
Im FS(R) sind für E_{r_1}, ..., E_{r_4} abhängig von $f(E_{g_1})$, $f(E_{g_2})$ nur bestimmte Blöcke möglich:

$f(E_{g_1})$	$f(E_{g_2})$	Block im FS(G)	Blöcke im FS(R)	
			m = 4	m > 4
2	1	A2	B3	B3, B5, C1
	4		B4	B4, B2, C5
1	2	A1	B1	B1, B6, C3
	4		B2	B2, B4, C5
4	1	A3	B5	B5, B3, C1
	2		B6	B6, B1, C3

Wir betrachten die möglichen Färbungen von E_{g_1}.

$f(E_{g_1}) = 1$. Für $f(E_{g_2}) = 2$ haben wir im FS(R) Block B2, für $f(E_{g_2}) = 4$ haben wir im FS(R) Block B3.

Aus den Färbungen der beiden Blöcke erhalten wir Block A1 (nächste Seite):

	E_{g_1}			E_{g_3}	E_{g_2}
	E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}	
				1	
					2
				4	
G	1				
				1	
					4
				2	
			1	4	
		2			
			4	1	
R, B1	1				2
			1	4	
		4			
			2	1, 4	
			1	2	
		4			
			2	1	
R, B2	1				4
			1	2	
		2			
			4	1, 2	

	E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}
				2
			1	
				4
		2		
				2
			4	
				1
G+R, A1				
				4
			1	
				2
		4		
				4
			2	
				1

Block B6. Aus den Färbungen dieser beiden Blöcke erhalten wir Block A3:

	E_{g_1}			E_{g_3}	E_{g_2}
	E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}	
				4	
					1
				2	
G	4				
				4	
					2
				1	
			4	2	
		1			
			2	4	
R, B6	4				1
			4	2	
		2			
			1	4, 2	
			4	1	
		1			
			2	4, 1	
R, B5	4				2
			4	1	
		2			
			1	4	
				1	
			4		
				2	
		1			
				1	
			2		
				4	
G+R	4				
				2	
			4		
				1	
		2			
				2	
			1		
				4	

$f(E_{g_1}) = 2$. Für $f(E_{g_2}) = 1$, bzw. $f(E_{g_2}) = 4$ haben wir den Block B3 bzw. den Block B4. Aus den Färbungen dieser beiden Blöcke erhalten wird Block A2.

	E_{g_1}			E_{g_3}	E_{g_2}
	E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}	
				2	
					1
				4	
G	2				
				2	
					4
				1	
			2	4	
		1			
			4	2	
B3	2				1
			2	4	
		4			
			1	2, 4	
			2	1	
		4			
			1	2	
B4	2				4
			2	1	
		1			
			4	2, 1	
				1	
			2		
				4	
		1			
				1	
			4		
				2	
G+R, A2	2				
				4	
			2		
				1	
		4			
				4	
			1		
				2	

Für $E_{g_1} = E_2$ ist die Konstruktion im wesentlichen dieselbe, für E_{g_1} ist dann nur $f(E_{g_1}) = 2$ zu betrachten.

Jetzt betrachten wir m > 4 und das FS(R) für $E_{r_{m-3}}, E_{r_{m-2}}, E_{r_{m-4}}, E_{r_m}$



Damit wir ein FS für G+R erhalten, muß - wie im Fall m=4 - bei der Konstruktion der Block des FS(R), der die Kopplung $E_{r_{m-1}}, E_{r_m}$ beschreibt, durch einen Block ohne Kopplung ersetzt werden. Welche Blöcke im FS(R) tatsächlich vorliegen hängt von m ab.

Für $f(E_{g_1}) = 2$, $f(E_{g_2}) = 1$, und die dazu möglichen Blöcken B3, B5, C1 im FS(R) (s. oben) erhalten wir als jeweils möglichen Block im FS(R) zu $f(E_{g_2}) = 4$
Block B3 => $f(E_{r_{m-3}}) = 2$ => zweiter Block ist B4, erledigt s. oben
Block B5 => $f(E_{r_{m-3}}) = 4$ => zweiter Block ist C5
Block C1 => $f(E_{r_{m-3}}) = 1$ => zweiter Block ist B2

Für $f(E_{g_2}) = 1$ ist $f(E_{g_3}) = 2$ und 4, für $f(E_{g_2}) = 4$ ist $f(E_{g_3}) = 1$ und 2. Dies liefert die Bedingungen dafür, welche Färbungen für G+R möglich sind wegen $E_{r_m} = E_{g_3}$.
Entsprechendes gilt für die nächsten Fälle.

	$E_{r_{m-3}}$	$E_{r_{m-2}}$	$E_{r_{m-1}}$	E_{r_m}	$E_{r_{m-3}}$	$E_{r_{m-2}}$	$E_{r_{m-1}}$	E_{r_m}	
			4	2				1	
		1					4		
			2	4				2	
R, B5	4					1			
			4	2				1	
		2					2		
			1	4, 2				4	
					4				G+R, A3
			4	2, 1				2	
		1					4		
			2	1				1	
R, C5	4					2			
			4	1, 2				2	
		2					1		
			1	2				4	

	r_{m-3}	r_{m-2}	r_{m-4}	r_m	r_{m-3}	r_{m-2}	r_{m-1}	r_m	
			1	4, 2				2	
		2					1		
			4	2				4	
R, C1	1					2			
			1	2, 4				2	
		4					4		
			2	4				1	
					1				G+R, A1
			1	2				4	
		4					1		
			2	1				2	
R, B2	1					4			
			1	2				4	
		2					2		
			4	1, 2				1	

Für $f(E_{g_1}) = 1$, $f(E_{g_2}) = 2$, und die dazu möglichen Blöcken (s. oben) erhalten wir als jeweils möglichen Block (im FS(R) zu $f(E_{g_2}) = 4$)
Block B1 => $f(E_{r_{m-3}}) = 2$ => zweiter Block ist B2, erledigt s. oben
Block B6 => $f(E_{r_{m-3}}) = 4$ => zweiter Block ist C5
Block C3 => $f(E_{r_{m-3}}) = 1$ => zweiter Block ist B4

	$E_{r_{m-3}}$	$E_{r_{m-2}}$	$E_{r_{m-4}}$	E_{r_m}	$E_{r_{m-3}}$	$E_{r_{m-2}}$	$E_{r_{m-1}}$	E_{r_m}
			4	1				1
		2					4	
			1	4				2
R, B6	4					1		
			4	1				1
		1					2	
			2	4, 1				4
					4			
			4	2, 1				2
		1					4	
			2	1				1
R, C5	4					2		
			4	1, 2				2
		2					1	
			1	2				4

	r_{m-3}	r_{m-2}	r_{m-4}	r_m	r_{m-3}	r_{m-2}	r_{m-1}	r_m
			2	4, 1				1
		1					2	
			4	1				4
C3	2					1		
			2	1, 4				1
		4					4	
			1	4				2
					2			
			2	1				4
		4					2	
			1	2				1
B4	2					4		
			2	1				4
		1					1	
			4	2, 1				2

Für $f(E_{g_1}) = 4$, $f(E_{g_2}) = 1$, und die dazu möglichen Blöcken (s. oben) erhalten wir als jeweils möglichen Block (im FS(R) zu $f(E_{g_2}) = 2$)
Block B5 => $f(E_{r_{m-3}}) = 4$ => zweiter Block ist B6, erledigt s. oben
Block B3 => $f(E_{r_{m-3}}) = 2$ => zweiter Block ist C3
Block C1 => $f(E_{r_{m-3}}) = 1$ => zweiter Block ist B1

	$E_{r_{m-3}}$	$E_{r_{m-2}}$	$E_{r_{m-4}}$	E_{r_m}	$E_{r_{m-3}}$	$E_{r_{m-2}}$	$E_{r_{m-1}}$	E_{r_m}
			2	4				1
		1					2	
			4	2				4
R, B3	2					1		
			2	4				1
		4					4	
			1	2, 4				2
					2			
			2	4, 1				4
		1					2	
			4	1				1
R, C3	2					4		
			2	1, 4				4
		4					1	
			1	4				2

	r_{m-3}	r_{m-2}	r_{m-4}	r_m	r_{m-3}	r_{m-2}	r_{m-1}	r_m
			1	4, 2				2
		2					1	
			4	2				4
R, C1	1					2		
			1	2, 4				2
		4					4	
			2	4				1
					1			
			1	4				4
		2					1	
			4	1				2
R, B1	1					4		
			1	4				4
		4					2	
			2	1, 4				1

Die konstruierten Färbungen bilden ein FS für G+R, insbesondere gibt es nur die gekoppelten Spalten der Ecken E_{n-1}, E_n.

von G+R. $E_{n-1} = E_{g_{k-1}}$ fällt nach innen.

2.1. k=3, die gekoppelte Ecken E_{r_m}, $E_{r_{m-1}}$ von R liegen auf dem Rand von G+R.

2.1.1 m=3, (ein Fall m=k) wir setzen $f(E_{r_2}) = f(E_{g_2})$.

2.1.2 m = 4, $E_{g_1} > E_2$



$E_{1,}E_2$ Basisseite von G, $f(E_1) = 1$, $f(E_2) = 2$. E_{g_1}, E_{g_2} Basisseite von R.
E_{g_2}, E_{g_3} gekoppelte Spalten von G, E_{r_3}, E_{r_4} gekoppelte Spalten von R

Für eine Farbe von E_{g_1} haben wir zwei Farben für E_{g_2} und daher zwei FS für R, da E_{g_1}, E_{g_2} Basisseite von R. Wir betrachten alle möglichen Fälle und konstruieren dazu jeweils das FS von G + R.

$f(E_{g_1}) = 1$, $f(E_{g_2}) = 2 oder 4$. Block von FS(G) (nur ein "halber" Block, die andere Hälfte gehört zu einem anderen Wert für $f(E_{g_1})$. Von folgenden Blöcken kommt der erste in Frage wegen $f(E_{g_3}) \neq 1$).

E_{g_1}	E_{g_2}	E_{g_3}	E_{g_1}	E_{g_2}	E_{g_3}	E_{g_1}	E_{g_2}	E_{g_3}
	2	4		2	4, 1		4	2, 1
1			1			1		
	4	2		4	1		2	1

dazu die Blöcke des FS(R) abhängig von $f(E_{g_1})$, $f(E_{g_2})$. Die Spalte $f(E_{g_3})$ zeigt die Bedingung für passende Färbungen.

g_2	g_1	r_2	r_3	r_4	g_3
			1	4	
		2			
			4	1	
2	1				4
			1	4	
		4			
			2	1, 4	
			1	2	
		2			
			4	1, 2	
4	1				2
			1	2	
		4			
			2	1	

Die möglichen Färbungen auf dem Rand von G+R (unter der Bedingung $f(E_{g_3}) = f(E_{r_4})$) sind:

E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}
1	2	1	4
1	4	1	4
1	4	2	4
1	2	1	2
1	2	4	2
1	4	1	2

die möglichen Färbungen für FS(G+R) als Block

E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}
		1	4, 2
	2		
		4	2
1			
		1	2, 4
	4		
		2	4

ein Block C1.

$f(E_{g_1})$ = 2, $f(E_{g_2})$ = 1, 4. Bei Block von FS(G) und dazu die Blöcke B3 bzw. B4 des FS(R) abhängig von $f(E_{g_2})$ =1 bzw. $f(E_{g_2})$ = 4.

	E_{g_1}			E_{g_3}	E_{g_2}
	E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}	E_{r_5}
				4, 2	1
G	2				
				2	4
			2	4	
		1			
			4	2	
R, B3	2				1
			2	4	
		4			
			1	2, 4	
			2	1	
		1			
			4	2, 1	
R, B4	2				4
			2	1	
		4			
			1	2	

Die möglichen Färbungen auf dem Rand von G+R sind:

2	1	2	4
2	1	4	2
2	4	2	4
2	4	1	2, 4
2	1	4	2
2	4	1	2

die passenden Färbungen als Block B3

		2	4
	1		
		4	2
2			
		2	4
	4		
		1	2, 4

(Von Block R, B3 passen übrigens schon alle Färbungen.)

$f(E_{g_1})$ = 4, $f(E_{g_2})$ = 1, 2. Der Block von FS(G) und dazu die Blöcke B5 bzw. B6 des FS(R) abhängig von $f(E_{g_2})$ =1 bzw. $f(E_{g_2})$ = 2.

	E_{g_1}			E_{g_3}	E_{g_2}
	E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}	E_{r_5}
				1	2, 4
G	4				
				2	4
			2	4	
		1			
			4	2	
R, B5	4				2, 4
			1	4, 2	
		2			
			4	2	
			4	1	
		1			
			2	4, 1	
R, B6	4				4
			4	1	
		2			
			1	4	

Die möglichen Färbungen auf dem Rand von G+R sind:

4	1	2	4
4	1	4	2
4	2	1	4, 2
4	2	4	2
4	1	2	4
4	2	1	4

die passenden Färbungen als Block B3

		4	2
	1		
		2	4
4			
		4	2
	2		
		1	4, 2

Die Anzahl der Färbungen nimmt zu entsprechend $\gamma(G+R) = \gamma(G) + 1$. Die gekoppelten Spalten sind die Spalten zu E_{r_3}, $E_{r_4} = E_n$.



$E_{g_1} = E_2 \Rightarrow f(E_{g_1}) = f(E_2) = 2.$

Wie 2.1.2 mit $f(E_{g_1}) = 2.$

	E_1	E_{g_1}			E_{g_3}	E_{g_2}
		E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}	
					4, 2	1
G	1	2				
					2	4
				2	4	
			1			
				4	2	
R, B3		2				1
				2	4	
			4			
				1	2, 4	
				2	1	
			4			
				1	2	
R, B4		4				4
				4	1	
			2			
				1	4	

die passenden Färbungen als Block B3

				2	4
			1		
				4	2
	1	2			
				2	4
			4		
				1	2, 4

Die Färbungen das FS(R), B4 mit $f(E_{r_4}) = 1$ fallen weg, da E_{r_4} ($= E_{g_3}$) mit E_1 durch Kante verbunden ist und $f(E_1) = 1$.



$E_{1,}E_2$ Basisseite von G, $f(E_1) = 1$, $f(E_2) = 2$. E_{g_1}, E_{g_2} Basisseite von R.
E_{g_2}, E_{g_3} gekoppelte Spalten von G, $E_{r_{m-1}}, E_{r_m}$ gekoppelte Spalten von R
$f(E_{g_1}) = 1 \Rightarrow f(E_{g_2}) = 2, 4$
$f(E_{g_1}) = 2 \Rightarrow f(E_{g_2}) = 1, 4$
$f(E_{g_1}) = 4 \Rightarrow f(E_{g_2}) = 1, 2$
Zunächst sind für $E_{r_{m-3}}$, $E_{r_{m-2}}$, $E_{r_{m-1}}$, E_{r_m} im FS(R) folgende Blöcke FS(R) möglich:
$f(E_{g_2}) = 1$: B3, B5, C1
$f(E_{g_2}) = 2$: B1, B6, C3
$f(E_{g_2}) = 4$: B2, B4, C5

$f(E_{g_3})$ hat nur die Werte 2, 4. ($f(E_{g_3}) \neq f(E_1) = 1$)
Zu zwei Werten von $f(E_{g_2})$ gibt es je ein FS(R) beginnend mit der Basisseite $E_{g_2}\ E_{g_1}$, die gleich sind außer in der Spalte, die von E_{g_2} abhängt. Haben wir $f(E_{g_2}) = 2$ und Block B1, so gibt es dasselbe FS bis auf den letzten Block, dieser muß B2 sein. (Die ersten drei Spalten in B1, B2 müssen gleich sein.) So ergeben sich die folgenden möglichen Kombinationen:

$f(E_{g_1}) = 1$			$f(E_{g_1}) = 2$			$f(E_{g_1}) = 4$		
$f(E_{g_2}) = 2, 4$			$f(E_{g_2}) = 1, 4$			$f(E_{g_2}) = 1, 2$		
B1	mit	B2	B3	mit	B4	B3	mit	C3
B6		C5	B5		C5	B5		B6
C3		B4	C1		B2	C1		B1

Für diese Kombinationen konstruieren wir den Block zu $E_{r_{m-3}}$, $E_{r_{m-2}}$, $E_{r_{m-1}}$, E_{r_m} im FS(G+R).

$f(E_{g_1}) = 1,\ f(E_{g_2}) = 2, 4$

	$E_{r_{m-3}}$	$E_{r_{m-2}}$	$E_{r_{m-1}}$	E_{g_3} E_{r_m}	E_{g_2}	E_{g_3}
				4, 2	2	
G						1
				2	4	
			1	4		
		2				
			4	1		
R, B1	1				2	
			1	4		
		4				
			2	1, 4		
			1	2		
		2				
			4	1, 2		
R, B2	1				4	
			1	2		
		4				
			2	1		
passende Färbungen						
	1	2	1	4		
	1	4	1	4		
	1	4	2	4		
	1	2	1	2		
	1	2	4	2		
	1	3	1	2		
als Block						
			1	4, 2		
		2				
			4	2		
C1	1					
			1	4, 2		
		4				
			2	4		

$f(E_{g_1}) = 2,\ f(E_{g_2}) = 1, 4$

	$E_{r_{m-3}}$	$E_{r_{m-2}}$	$E_{r_{m-1}}$	E_{g_3} E_{r_m}	E_{g_2}	E_{g_1}
				4	2	
G						1
				2	4	
			2	4, 1		
		1				
			4	1		
R, C3	2				2	
			2	1, 4		
		4				
			1	4		
			2	1		
		4				
			1	2		
R, B4	2				4	
			2	1		
		1				
			4	2, 1		
passende Färbungen						
	2	1	2	4		
	2	4	2	4		
	2	4	1	4		
	2	4	1	2		
	2	1	4	2		
als Block						
			2	4		
		1				
			4	2		
B3	2					
			2	4		
		4				
			1	4, 2		

$f(E_{g_1}) = 4,\ f(E_{g_2}) = 1, 2$

	$E_{r_{m-3}}$	$E_{r_{m-2}}$	$E_{r_{m-1}}$	E_{g_3} E_{r_m}	E_{g_2}	E_{g_1}
				2, 4	1	
G						4
				4	2	
			4	1		
		2				
			1	4		
R, B6	4				2	
			4	1		
		1				
			2	4, 1		
			4	2, 1		
		1				
			2	1		
R, C5	4				4	
			4	1, 2		
		2				
			1	2		
passende Färbungen						
	4	2	1	4		
	4	1	2	4		
	4	1	4	2		
	4	2	4	2		
	4	2	1	2		
als Block						
			2	4		
		1				
			4	2		
B5	4					
			1	4, 2		
		2				
			4	2		

Damit ist für $f(E_{g_1}) = 1,\ f(E_{g_2}) = 2, 4$ für die drei möglichen Fälle B1 mit B2, B6 mit C5 und C3 mit B4 das FS(G+R) konstruiert.

Nun zu den jeweils drei möglichen Fällen für $f(E_{g_1})$ = 2, $f(E_{g_2})$ = 1, 4 und $f(E_{g_1})$ = 4, $f(E_{g_2})$ = 1, 2.

$f(E_{g_2})$ = 1 bzw. 4, $f(E_{g_3})$ = 2, 4 bzw. 2

	E_{g_1}	E_{g_2}	E_{g_3}
		1	2, 4
G	2		
		4	2

	$E_{r_{m-3}}$	$E_{r_{m-2}}$	$E_{r_{m-1}}$	E_{r_m}	E_{g_3}
			2	4	
		1			
			4	2	
B3	2				2, 4
			2	4	
		4			
			1	2, 4	
			2	1	
		4			
			1	2	
B4	2				2
			2	1	
		1			
			4	2, 1	

Der Block B3 kann komplett für FS(G+R) genommen werden.

Von den Blöcken B5, C5 kann B5 komplett für FS(G+R) genommen werden:

	$E_{r_{m-3}}$	$E_{r_{m-2}}$	$E_{r_{m-1}}$	E_{r_m}	E_{g_2}
			4	2	
		1			
			2	4	
B5	4				2, 4
			4	2	
		2			
			1	4, 2	

Von den Blöcken C1, B2 kann C1 komplett für FS(G+R) genommen werden:

	$E_{r_{m-3}}$	$E_{r_{m-2}}$	$E_{r_{m-1}}$	E_{r_m}	E_{g_2}
			1	4, 2	
		2			
			4	2	
C1	1				2, 4
			1	2, 4	
		4			
			2	4	

$f(E_{g_2})$ = 1 bzw. 2, $f(E_{g_3})$ = 2, 4 bzw. 4

		1	2, 4
G	4		
		2	4

B3, B5, C1 können komplett für FS(G+R) genommen werden.



Wir erhalten wie in 2.1.4 mit $f(E_{g_1}) = 2$ für FS(G+R) den Block B3.

Weitere Färbungen von $f(E_{g_2}) = 4$ sind möglich, werden nicht benötigt.

2.2.1 k=4, m=3, $E_{g_1} > E_2$



E_{g_4}, E_{g_3} gekoppelte Ecken von G. E_{r_3}, E_{r_4} (= E_{g_3}) gekoppelte Ecken von R.
Die gekoppelten Ecken von G werden identifiziert mit den gekoppelten Ecken von R.

$f(E_{g_1})$ = 1, 2 oder 4.
$f(E_{g_1})$ = 1 => $f(E_{g_2})$ = 2, 4.
Block FS(G)

	E_{g_1}	E_{g_2}	E_{g_3}	E_{g_4}
			1	4, 2
		2		
			4	2
G, C1	1			
			1	2, 4
		4		
			2	4

Block FS(R) für $f(E_{g_2})$ = 2 und $f(E_{g_2})$ = 4.

	E_{r_5}	E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}
				1	4
			2		
				4	1
R, B1	2	1			
				1	4
			4		
				2	1, 4

	E_{r_5}	E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}
				1	2
			2		
				4	1, 2
R, B2	4	1			
				1	2
			4		
				2	1

in einer Tabelle

	E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}	E_{r_5}
	E_{g_1}		E_{g_4}	E_{g_3}	E_{g_2}
			4, 2	1	
					2
			2	4	
G	1				
			2, 4	1	
					4
			4	2	
			1	4	
		2			
			4	1	
R, B1	1				2
			1	4	
		4			
			2	1, 4	
			1	2	
		2			
			4	1, 2	
R, B2	1				4
			1	2	
		4			
			2	1	

finden wir als passende Färbungen

1	2	4	1	2
	4	2	1	2
	4	2	4	2
	4	2	1	4
	2	4	1	4
	2	4	2	4

als Block des FS(G+R)

	2	4
1		
	4	2

Zu einem Wert $f(E_{g_1}) = 1$ gibt es die gekoppelten Spalten für E_{r_2} E_{r_3}.

Dasselbe für $f(E_{g_1})$ = 2, $f(E_{g_2})$ = 1, 4.

	E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}	E_{r_5}
	E_{g_1}		E_{g_4}	E_{g_3}	E_{g_2}
			4	1	
					1
			2	4	
G, B3	2				
			4	2	
					4
			2, 4	1	
			2	4	
		1			
			4	2	
R, B3	2				1
			2	4	
		4			
			1	4	
			2	1	
		1			
			4	2, 1	
R, B4	2				4
			2	1	
		4			
			1	2	

finden wir als passende Färbungen

2	1	4	2	1
	4	2	4	1
	1	2	4	1
	1	4	2	4
	1	2	1	4
	4	2	1	4
	1	4	1	4

als Block des FS(G+R)

	1	2, 4
2		
	4	2

$f(E_{g_1})$ 4, $f(E_{g_2})$ 1, 2.

	E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}	E_{r_5}
	E_{g_1}		E_{g_4}	E_{g_3}	E_{g_2}
			2	4	
					1
			4	2	
G, B5	4				
			2	4	
					2
			4, 2	1	
			4	2	
		1			
			2	4	
R, B5	4				1
			4	2	
		2			
			1	4, 2	
			4	1	
		1			
			2	4, 1	
R, B6	4				2
			4	1	
		2			
			1	4	

finden wir als passende Färbungen

4	1	2	4	1
	2	4	2	1
	1	2	4	2
	1	4	1	2
	2	4	1	2
	1	2	1	2

als Block des FS(G+R)

	1	4, 2	
4			
	2	4	

2.2.2 k=4, m=3, $E_{g_1} = E_2$



$f(E_{g_1}) = f(E_2) = 2.$

Wie oben, jedoch ist nur der Fall $f(E_{g_1}) = 2$ zu betrachten.



$f(E_{g_1}) = 1.$

	E_{g_1}			E_{g_4}	E_{g_3}	E_{g_2}
	E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}	E_{r_5}	
				4, 2	1	
						2
				2	4	
G	1					
				2, 4	1	
						4
				4	2	
				2	4, 1	
			1			
				4	1	
		2				
				2	1, 4	
			4			
				1	4	
R	1					2
				4	1	
			1			
				2	4, 1	
		4				
				4	1	
			2			
				1	4	

Fortsetzung der Tabelle nächste Seite.

	E_{g_1}			E_{g_4}	E_{g_3}	E_{g_2}
	E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}	E_{r_5}	
				2	1	
			1			
				4	2, 1	
		2				
				2	1	
			4			
				1	2	
R	1					4
				4	2, 1	
			1			
				2	1	
		4				
				4	1, 2	
			2			
				1	2	
			1	2, 4		
		2				
			4	2		
G+R, C1	1					
			1	4, 2		
		4				
			2	4		

k=4, m=3, $E_{g_1} = E_2$



$f(E_{g_1}) = f(E_2) = 2.$

Wie oben, jedoch ist nur der Fall $f(E_{g_1}) = 2$ zu betrachten.



E_{g_4}, E_{g_3} gekoppelte Ecken von G. E_{r_3}, E_{r_4} (= E_{g_3}) gekoppelte Ecken von R.
Die gekoppelten Ecken von G werden identifiziert mit den gekoppelten Ecken von R.

$f(E_{g_1})$ = 1, 2 oder 4.
$f(E_{g_1})$ = 1 => $f(E_{g_2})$ = 2, 4 => Block FS(G) = C1.

	E_{g_1}	E_{g_2}	E_{g_3}	E_{g_4}
			1	4, 2
		2		
			4	2
G, C1	1			
			1	2, 4
		4		
			2	4

Block FS(R) für $f(E_{g_2})$ = 2 und $f(E_{g_2})$ = 4.

	E_{r_5}	E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}
				1	4
			2		
				4	1
R, B1	2	1			
				1	4
			4		
				2	1, 4

	E_{r_5}	E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}
				1	2
			2		
				4	1, 2
R, B2	4	1			
				1	2
			4		
				2	1

in einer Tabelle

	E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}	E_{r_5}
	E_{g_1}		E_{g_4}	E_{g_3}	E_{g_2}
			4, 2	1	
					2
			2	4	
G	1				
			2, 4	1	
					4
			4	2	
			1	4	
		2			
			4	1	
R, B1	1				2
			1	4	
		4			
			2	1, 4	
			1	2	
		2			
			4	1, 2	
R, B2	1				4
			1	2	
		4			
			2	1	

finden wir als passende Färbungen

1	2	4	1	2
	4	2	1	2
	4	2	4	2
	4	2	1	4
	2	4	1	4
	2	4	2	4

als Block des FS(G+R)

	2	4
1		
	4	2

Zu einem Wert $f(E_{g_1}) = 1$ gibt es die gekoppelten Spalten für $E_{r_{m-1}}$ E_{r_m}.

Dasselbe für $f(E_{g_1})$ = 2, $f(E_{g_2})$ = 1, 4.

	E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}	E_{r_5}
	E_{g_1}		E_{g_4}	E_{g_3}	E_{g_2}
			4	1	
					1
			2	4	
G, B3	2				
			4	2	
					4
			2, 4	1	
			2	4	
		1			
			4	2	
R, B3	2				1
			2	4	
		4			
			1	4	
			2	1	
		1			
			4	2, 1	
R, B4	2				4
			2	1	
		4			
			1	2	

finden wir als passende Färbungen

2	1	4	2	1
	4	2	4	1
	1	2	4	1
	1	4	2	4
	1	2	1	4
	4	2	1	4
	1	4	1	4

als Block des FS(G+R)

	1	2, 4
2		
	4	2

$f(E_{g_1})$ 4, $f(E_{g_2})$ 1, 2.

	E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}	E_{r_5}
	E_{g_1}		E_{g_4}	E_{g_3}	E_{g_2}
			2	4	
					1
			4	2	
G, B5	4				
			2	4	
					2
			4, 2	1	
			4	2	
		1			
			2	4	
R, B5	4				1
			4	2	
		2			
			1	4, 2	
			4	1	
		1			
			2	4, 1	
R, B6	4				2
			4	1	
		2			
			1	4	

finden wir als passende Färbungen

4	1	2	4	1
	2	4	2	1
	1	2	4	2
	1	4	1	2
	2	4	1	2
	1	2	1	2

als Block des FS(G+R)

	1	4, 2	
4			
	2	4	

2.2.3 k=4, m>4, $E_{g_1} = E_2$



$f(E_{g_1}) = f(E_2) = 2.$

Wie oben, jedoch ist nur der Fall $f(E_{g_1}) = 2$ zu betrachten.

$E_{g_1} > E_2$



$E_{g_1} = E_2$



$f(E_{g_1}) = 1$, 2 oder 4, $f(E_{g_1}) = 2$ nur möglich, wenn $E_{g_1} = E_2$ oder wenn zwischen $E_{g_1} = E_2$ mindestens eine weitere Ecke liegt.
$f(E_{g_5}) \neq 1$ wegen $f(E_1) = 2$.

$f(E_{g_1}) = 1$, dann ist $f(E_{g_2}) = 2$ oder 4 und $f(E_{r_2}) = 2$ oder 4.

$f(E_{g_2}) = 2$.

$f(E_{g_5}) \neq 1$ => G Block B3.

$f(E_{r_5}) \neq 2$ und $f(E_{r_2}) = 2$ => R Block C3

$f(E_{r_5}) \neq 2$ und $f(E_{r_2}) = 4$ => R Block B6

	E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}	E_{r_5}	
	E_{g_1}		E_{g_5}	E_{g_4}	E_{g_3}	E_{g_2}
			4	2		
					1	
			2	4		
G, B3	1					2
			4	2		
					4	
			2, 4	1		
				2	4, 1	
			1			
				4	1	
R, C3	1	2				
				2	1, 4	
			4			
				1	4	
				4	1	
			1			
				2	4, 1	
R, B6	1	4				
				4	1	
			2			
				1	4	

daraus die passenden Färbungen:

	1	2	4	2	1
			4	2	4
			4	1	4
G+R					
	1	4	2	4	1
			2	1	4

(benötigt wird natürlich nur eine passende Färbung um R anschließen zu können.)

also auf dem Rand von G+R

E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}
	2	4
1		
	4	2

$f(E_{g_2}) = 4$

$f(E_{g_5}) \neq 1$ => G Block Typ B5.

$f(E_{r_5}) \neq 4$ und $f(E_{r_2}) = 2$ => R Block B4

$f(E_{r_5}) \neq 4$ und $f(E_{r_2}) = 4$ => R Block C5

	E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}	E_{r_5}	
	E_{g_1}		E_{g_5}	E_{g_4}	E_{g_3}	E_{g_2}
			4	2		
					1	
			2	4		
G, B5	1					4
			2	4		
					2	
			2, 4	1		
				2	1	
			1			
				4	2, 1	
R, B4	1	2				
				2	1	
			4			
				1	2	
				4	2, 1	
			1			
				2	1	
R, C5	1	4				
				4	1, 2	
			2			
				1	2	

daraus die passenden Färbungen:

	1	2	4	2	1
			4	1	2
G+R					
	1	4	2	4	1
			2	4	2
			2	1	2

also

E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}
	2	4
1		
	4	2

$f(E_{g_1}) = 2$, dann ist $f(E_{g_2}) = 1$ oder 4 und $f(E_{r_2}) = 1$ oder 4.
$f(E_{g_2}) = 1$
$f(E_{g_5}) \neq 1$ => G Block C1.
$f(E_{r_5}) \neq 1$ und $f(E_{r_2}) = 1$ => R Block C1
$f(E_{r_5}) \neq 1$ und $f(E_{r_2}) = 4$ => R Block B5

	E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}	E_{r_5}	
	E_{g_1}		E_{g_5}	E_{g_4}	E_{g_3}	E_{g_2}
			4, 2	1		
					2	
			2	4		
G, C1	2					1
			2, 4	1		
					4	
			4	2		
				1	4, 2	
			2			
				4	2	
R, C1	2	1				
				1	2, 4	
			4			
				2	4	
				4	2	
			1			
				2	4	
R, B5	2	4				
				4	2	
			2			
				1	4, 2	

daraus die passenden Färbungen:

2	1	4	1	2
		2	1	2
2	4	2	1	2

also

E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}
	1	4, 2
2		
	4	2

$f(E_{g_1}) = 2,\ f(E_{g_2}) = 1$
$f(E_{g_5}) \neq 1$ => G Block B5.
$f(E_{r_5}) \neq 4\ \ f(E_{r_2}) = 1$ => R Block B2
$f(E_{r_5}) \neq 4\ \ f(E_{r_2}) = 4$ => R Block C5

	E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}	E_{r_5}	
	E_{g_1}		E_{g_5}	E_{g_4}	E_{g_3}	E_{g_2}
			2	4		
					1	
			4	2		
G, B5	2					4
			2	4		
					2	
			4, 2	1		
				1	2	
			2			
				4	1, 2	
R, B2	2	1				
				1	2	
			4			
				2	1	
				4	2, 1	
			1			
				2	1	
R, B5	2	4				
				4	1, 2	
			2			
				1	2	

daraus die passenden Färbungen:

2	1	2	4	1
		4	2	1
		2	4	2
2	4	2	4	1
		2	4	2
		2	1	2

also

E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}
	1	2, 4
2		
	4	2

$f(E_{g_1}) = 4$, dann ist $f(E_{g_2}) = 1$ oder 2 und $f(E_{r_2}) = 1$ oder 2.
$f(E_{g_2}) = 1$
$f(E_{g_5}) \neq 1$ => G Block C1.
$f(E_{r_5}) \neq 1$ $f(E_{r_2}) = 1$ => R Block C1.
$f(E_{r_5}) \neq 1$ $f(E_{r_2}) = 2$ => R Block B3.

	E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}	E_{r_5}	
	E_{g_1}		E_{g_5}	E_{g_4}	E_{g_3}	E_{g_2}
			4, 2	1		
					2	
			2	4		
G, C1	4					1
			4	2		
					4	
			2, 4	1		
				2	4, 1	
			1			
				4	1	
R, B3	4	2				
				1	4	
			4			
				2	1, 4	
				1	4, 2	
			2			
				4	2	
R, C1		1				
				1	4	
			4			
				2	4, 1	

daraus die passenden Färbungen:

4	2	4	1	4
		4	2	4
	1	2	1	2
		2	4	2
		2	1	4
		4	1	4
		4	2	1

also

E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}
	2	4
4		
	1	2, 4

$f(E_{g_1}) = 4$,
$f(E_{g_2}) = 2$ => G Typ B3.
$f(E_{r_5}) \neq 2,\ f(E_{r_2}) = 1$ => R Typ B1.
$f(E_{r_5}) \neq 2,\ f(E_{r_2}) = 2$ => G Typ C3.

	E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}	E_{r_5}	
	E_{g_1}		E_{g_5}	E_{g_4}	E_{g_3}	E_{g_2}
			4	2		
					1	
			2	4		
G, B3	4					2
			4	2		
					4	
			2, 4	1		
				1	4	
			2			
				4	1	
R, B1	4	1				
				1	4	
			4			
				2	1, 4	
				2	4, 1	
			1			
				4	1	
R, C3	4	2				
				2	1, 4	
			4			
				1	4	

daraus die passenden Färbungen:

4	1	4	2	1
		2	4	1
		4	2	4
		2	1	4
		4	1	4
	2	4	2	1
		4	2	4
		4	1	4

also

E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}
	1	2, 4
1		
	2	4

2.4.2 R→G, in G:

Die gekoppelten Ecken von G werden mit nicht gekoppelten Ecken von R identifiziert.

Die gekoppelten Ecken von R werden mit nicht gekoppelten Ecken von G identifiziert.

Die entsprechenden Blöcke des FS(G) zu den gekoppelten Ecken passen immer zu den normalen Blöcken des FS(R) der nicht gekoppelten Ecken.

Die entsprechenden Blöcke des FS(R) zu den gekoppelten Ecken passen immer zu den normalen Blöcken des FS(G) der nicht gekoppelten Ecken. (s. Tabelle oben.)



$E_{g_k}, E_{g_{k-1}}$ sind die gekoppelten Ecken von G.
$E_{r_{m+k-3}}, E_{r_{m+k-4}}$ sind die gekoppelten Ecken von R.
Die gekoppelten Ecken von G liegen nicht beide auf dem Rand von G+R.
Die gekoppelten Ecken von R liegen nicht auf dem Rand von G+R.
Die gekoppelten Ecken von G werden mit nicht gekoppelten Ecken von R identifiziert.
Die gekoppelten Ecken von R werden mit nicht gekoppelten Ecken von G identifiziert.

Bei der Konstruktion des FS(G+R) erwarten wir für $E_{r_{m+k-1}}, E_{g_{m+k}}$ gekoppelte Spalten.

Zwischen $E_{r_{k-1}}$ und E_{g_4} werden Ecken identifiziert, deren Färbungen durch A1, A2 oder A3 beschrieben werden, also gibt es immer passende Färbungen: für $E_{g_{k-2}}$ $E_{r_{m+2}}$, $E_{g_{k-3}}$ $E_{r_{m+3}}$, ..., gibt es immer passende Färbungen: zu $f(E_{g_{k-i}})$ = $f(E_{r_{m+i}})$ = 1 bzw. 2 bzw. 4 ist $f(E_{g_{k-i-1}})$ = 2 oder 4, bzw. 1 oder 4, bzw. 1 oder 2 und
$f(E_{r_{m+i+1}})$ = 2 und 4 bzw. 1 und 4 bzw. 1 und 2.

Wir betrachten
(1) die "Umgebung" von E_{r_m}
(2) die "Umgebung" von $E_{r_{m+k-4}}, E_{g_{m+k-3}} = E_{g_3}, E_{g_4}$.

Zu (1)

die möglichen Blöcke von G sind B3, B5, C1 ($f(E_{g_k}) \neq 1$),
die möglichen Blöcke von R sind A1, A2, A3, welcher hängt von m ab.
FS(G), B3 mit FS(R), A1

			E_{g_k}	$E_{g_{k-1}}$	$E_{g_{k-2}}$	$E_{g_{k-3}}$
	$E_{r_{m-2}}$	$E_{r_{m-1}}$	E_{r_m}	$E_{r_{m+1}}$	$E_{r_{m+2}}$	
			4	2		
					1	
			2	4		
G, B3						2
			4	2		
					4	
			2, 4	1		
				2		
			1			
				4		
		2				
				2		
			4			
				1		
R, A1	1					
				4		
			1			
				2		
		4				
				4		
			2			
				1		

die möglichen Färbungen für FS(G+R) als Block

		2	4
	1		
		4	2

			E_{g_k}	$E_{g_{k-1}}$	$E_{g_{k-2}}$	$E_{g_{k-3}}$
	$E_{r_{m-2}}$	$E_{r_{m-1}}$	E_{r_m}	$E_{r_{m+1}}$	$E_{r_{m+2}}$	
			4	2		
					1	
			2	4		
G, B3						2
			4	2		
					4	
			2, 4	1		

				1		
			2			
				4		
		1				
				1		
			4			
				2		
R, A2	2					
				4		
			2			
				1		
		4				
				4		
			1			
				2		

die möglichen Färbungen für FS(G+R) als Block

		1	4, 2			
	2					
		4	2			

				1		
			4			
				2		
		1				
				1		
			2			
				4		
R, A3	4					
				2		
			4			
				1		
		2				
				2		
			1			
				4		

die möglichen Färbungen für FS(G+R) als Block

		1	2, 4			
	4					
		2	4			

			E_{g_k}	$E_{g_{k-1}}$	$E_{g_{k-2}}$	$E_{g_{k-3}}$
	$E_{r_{m-2}}$	$E_{r_{m-1}}$	E_{r_m}	$E_{r_{m+1}}$	$E_{r_{m+2}}$	
			2	4		
					1	
			4	2		
G, B5						4
			2	4		
					2	
			4, 2	1		

				2		
			1			
				4		
		2				
				2		
			4			
				1		
R, A1	1					
				4		
			1			
				2		
		4				
				4		
			2			
				1		
				1		
			2			

die möglichen Färbungen für FS(G+R) als Block

			2	4, 2		
		1				
			2	4		

				4		
		1				
				1		
			4			
				2		
R, A2	2					
				4		
			2			
				1		
		4				
				4		
			1			
				2		

die möglichen Färbungen für FS(G+R) als Block

		1	4, 2			
	2					
		4	2			

			E_{g_k}	$E_{g_{k-1}}$	$E_{g_{k-2}}$	$E_{g_{k-3}}$
	$E_{r_{m-2}}$	$E_{r_{m-1}}$	E_{r_m}	$E_{r_{m+1}}$	$E_{r_{m+2}}$	
			2	4		
					1	
			4	2		
G, B5						4
			2	4		
					2	
			4, 2	1		

				1
			4	
				2
		1		
				1
			2	
				4
R, A3	4			
				2
			4	
				1
		2		
				2
			1	
				4

---

die möglichen Färbungen für FS(G+R) als Block

		1	2, 4
	4		
		2	4

FS(G), C1 mit FS(R), A1, A2, A3.

Wir erhalten völlig analog

	2	4
1		
	4	2

	1	4, 2
2		
	4	2

	1	2, 4
4		
	2	4

Zu (2)

Jetzt betrachten wir die gekoppelten Ecken von R, die mit normalen Ecken von G identifiert werden. Wir müssen lediglich zeigen, daß es passende Färbungen gibt.

Für E_{g_1}, E_{g_2}, E_{g_3}, E_{g_4}, haben wir im FS(G) A1, A2 oder A3, (falls $E_2 = E_{g_2}$ A2). Mit E_{g_1}, E_{g_2} als Basisseite von R und abhängig von $f(E_{g_2})$ sind für $E_{r_{m+k-6}}$, $E_{r_{m+k-5}}$, $E_{r_{m+k-4}}$, $E_{r_{m+k-3}}$ im FS(R) folgende Blöcke möglich:

$f(E_{g_2})$	Blöcke
1	B3 B5 C1
2	B1 B6 C3
4	B2 B4 C5

(Falls $E_2 = E_{g_1}$ ist $E_{r_1} = 2$ und es muß auch $f(E_{g_2}) = 1$ betrachtet werden.)

Block G	$f(E_{g_2})$	Blöcke von R
A1	2, 4	B1 und B2
		B6 und C5
		C3 und B4
A2	1, 4	B3 und B4
		B5 und C5
		C1 und B2
A2	1, 2	B3 und C3
		B5 und B6
		C1 und B1

Wir betrachten alle Kombinationen für G, Block A1. Die Kombinationen für G, Block A2 und G, Block A3 gehen völlig analog.

$E_{r_{m+k-4}}$.

			E_{g_4}	E_{g_3}	E_{g_2}	E_{g_1}
	$E_{r_{m+k-6}}$	$E_{r_{m+k-5}}$	$E_{r_{m+k-4}}$	$E_{r_{m+k-3}}$		
			2			
				1		
			4			
					2	
			2			
				4		
			1			
G, A1						1
			4			
				1		
			2			
					4	
			4			
				2		
			1			
			1	4		
		2				
			4	1		
R, B1	1				2	
			1	4		
		4				
			2	1, 4		
			1	2		
		2				
			4	1, 2		
R, B2	1				4	
			1	2		
		4				
			2	1		

Wir stellen fest, daß es zu jeder Färbung im FS(G) eine passende Färbung in B1 oder B2 gibt und umgekehrt.

	$E_{r_{m+k-6}}$	$E_{r_{m+k-5}}$	$E_{r_{m+k-4}}$	$E_{r_{m+k-3}}$		
			2			
				1		
			4			
					2	
			2			
				4		
			1			
G, A1						1
			4			
				1		
			2			
					4	
			4			
				2		
			1			
			4	1		
		2				
			1	4		
R, B6	4				2	
			4	1		
		1				
			2	4, 1		
			4	2, 1		
		1				
			2	1		
R, C3	4				4	
			4	1, 2		
		2				
			1	2		

Wir stellen fest, daß es zu jeder Färbung im FS(G) eine passende Färbung in B6 oder C3 gibt und umgekehrt.

	$E_{r_{m+k-6}}$	$E_{r_{m+k-5}}$	$E_{r_{m+k-4}}$	$E_{r_{m+k-3}}$		
			2			
				1		
			4			
					2	
			2			
				4		
			1			
G, A1						1
			4			
				1		
			2			
					4	
			4			
				2		
			1			
			2	4, 1		
		1				
			4	1		
R, C2	2				2	
			2	1, 4		
		4				
			1	4		
			2	1		
		1				
			4	2, 1		
R, B4	2				4	
			1	2		
		4				
			2	1		

Wir stellen fest, daß es zu jeder Färbung im FS(G) eine passende Färbung in C2 oder B4 gibt und umgekehrt.



Wir betrachten die möglichen Färbungen von E_{g_1} und die entsprechenden Blöcke des FS(G). Daraus ergeben sich die Färbungen von E_{r_2}.
(R ist maximal, $\gamma(R) = 3$, hat also passende Färbungen, wenn $f(E_{g_1}) \neq f(E_{g_2}) \neq f(E_{g_3}) \neq f(E_{g_1})$.)

		E_{g_1}	E_{g_2}	E_{g_3}	
			2	4	
$f(E_{g_1}) = 1 \Rightarrow f(E_{g_2}) = 2, 4$	G	1			$f(E_{r_2}) = 2, 4$
			4	2	
			1	4, 2	
$f(E_{g_1}) = 2 \Rightarrow f(E_{g_2}) = 1, 4$	G	2			$f(E_{r_2}) = 4$
			4	2	
			1	2, 4	
$f(E_{g_1}) = 4 \Rightarrow f(E_{g_2}) = 1, 2$	G	4			$f(E_{r_2}) = 2$
			4	2	

Nun betrachten wir E_{g_1-1} (falls $E_{g_1-1} = E_2$ ist nur $f(E_{g_1-1}) = 2$ zutreffend) und erhalten die Blöcke des FS(G+R):

		E_{g_1-1}	E_{r_1}	E_{r_2}
			2	4
$f(E_{g_1-1}) = 1 \Rightarrow f(E_{g_1}) = 2, 4$	G+R	1		
			4	2
			1	4, 2
$f(E_{g_1-1}) = 2 \Rightarrow f(E_{g_1}) = 1, 4$	G+R	2		
			4	2
			1	2, 4
$f(E_{g_1-1}) = 4 \Rightarrow f(E_{g_1}) = 1, 2$	G+R	4		
			2	4

3.1.2 k=3, m=2, $E_{g_1} = E_2$



$\gamma(G) = 4$.

	E_1	E_{g_1}	E_{g_2}	E_{g_3}
			1	4, 2
FS(G) =	1	2		
			4	2

also ist

	E_1	E_{r_1}	E_{r_2}
FS(G+R) =	1	2	4

(3.2.1 nächste Seite)

3.2.2 k=4, m=2, $E_{g_1} = E_2$



$\gamma(G) = 5$.

	E_1	E_{g_1}	E_{g_2}	E_{g_3}	E_{g_4}
				2	4
			1		
				4	2
FS(G) =	1	2			
				2	4
			4		
				1	2, 4

also ist

	E_1	E_{r_1}	E_{r_2}
FS(G+R) =	1	2	4

3.2.1 k = 4, in 2, E_{g_1}, E_2



Wir betrachten die möglichen Färbungen von E_{g_1} und die entsprechenden Blöcke des FS(G). Daraus ergeben sich die Färbungen von E_{r_2}.

Sei $f(E_{g_1})$ = 1. (Block von FS(G) ist C1.)

E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}
E_{g_1}	E_{g_4}	E_{g_3}	E_{g_2}
	4, 2	1	
			2
	2	4	
1			
	2, 4	1	
			4
	4	2	

FS(R), $f(E_{r_4})$ = 2

	2	1, 4	
			2
	4	1	

FS(R), $f(E_{r_4})$ = 4

	2	1	
1			4
	4	2, 1	

passende Färbungen

1	4	1	2
	2	1	2
	2	4	2
	2	1	4
	4	1	4
	4	2	4

auf dem Rand von G+R

1	2, 4

Sei $f(E_{g_1}) = 2$.
Dies ist der einzige zu betrachtende Fall, wenn $E_{g_1} = E_2$.

E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}
E_{g_1}	E_{g_4}	E_{g_3}	E_{g_2}
	4	2	
			1
	2	4	
2			
	4	2	
			4
	2, 4	1	

FS(R), $f(E_{r_4}) = 1$

	1	4, 2	
2			1
	4	2	

FS(R), $f(E_{r_4}) = 4$

	1	2	
2			4
	4	1, 2	

passende Färbungen

2	4	2	1
	4	2	4
	4	1	4

auf dem Rand von G+R

2	4

Sei $f(E_{g_1}) = 4$.

E_{r_1}	E_{r_2}	E_{r_3}	E_{r_4}
E_{g_1}	E_{g_4}	E_{g_3}	E_{g_2}
	2	4	
			1
	4	2	
4			
	2	4	
			2
	2, 4	1	

FS(R), $f(E_{r_4}) = 1$

	1	4, 2	
4			1
	2	4	

FS(R), $f(E_{r_4}) = 2$

	1	4	
4			2
	2	1, 4	

passende Färbungen

4	2	4	1
	2	4	2
	2	1	2

auf dem Rand von G+R

4	2

Für FS(G+R) erhalten wir

$f(E_{g_1-1})$	$f(E_{g_1})$	E_{g_1-1}	E_{r_1}	E_{r_2}
			2	4
1	2, 4	1		
			4	2
			1	4, 2
2	1, 4	2		
			4	2
			1	2, 4
4	1, 2	4		
			2	4



R anschließen mit der gleichen Orientierung.

Zu jedem Element der Spalte von E_{g_1} gehört ein TeilFS von G das wir als FS(R) betrachten können. E_{g_1} E_{g_2} als Basisseite. Wegen der Kante E_{r_1} E_{r_2} fallen in diesem FS in der Spalte von $E_{r_2} = E_{g_k}$ alle Elemente weg, die gleich $f(E_{g_1})$ sind.

Wir betrachten FS(G), der letzte Block kann sein: B3, B5, C1

Wir betrachten B3 und die möglichen Färbungen von E_{r_2} in Abhängigkeit von $f(E_{g_1})$. ($E_{r_i} = E_{g_{k+2-i}}$, i=2, ..., 5)

E_{g_k}	$E_{g_{k-1}}$	$E_{g_{k-2}}$	$E_{g_{k-3}}$	E_{g_1}	E_{r_2}
		2	4	1	2, 4
	1			2	4
		4	2	4	2
2					
		2	4		
	4				
		1	2, 4		

Dasselbe für B5

E_{g_k}	$E_{g_{k-1}}$	$E_{g_{k-2}}$	$E_{g_{k-3}}$	E_{g_1}	E_{r_2}
		4	2	1	2, 4
	1			2	4
		2	4	4	2
4					
		4	2		
	2				
		1	4, 2		

und für C1

E_{g_k}	$E_{g_{k-1}}$	$E_{g_{k-2}}$	$E_{g_{k-3}}$	E_{g_1}	E_{r_2}
		1	4, 2	1	4, 2
	2			2	4
		4	2	4	2
1					
		1	2, 4		
	4				
		2	4		

Betrachtung dazu die Werte für $f(E_{r_2})$, dargestellt als Blöcke:

E_{g_1-1}	E_{g_1}	E_{r_2}
	2	4
1		
	4	2
	1	2, 4
2		
	4	2
	1	4, 2
4		
	2	4

Wir erhalten FS(G+R) mit E_{r_1} E_{r_2} als gekoppelte Spalten. Falls $E_{g_1-1} = E_2$ ist nur $f(E_{g_1-1}) = 2$ möglich und es ist $\gamma(G + R) = 4$, dann erhalten wir:

			1	2, 4
FS(G+R) =	1	2		
			4	2

Wenn $E_{g_1} = E_2$ dann ist $f(E_{g_1}) = 2$ und $f(E_{r_1}) = 4$ und G+R ist maximal, FS(G+R) = 1 2 4.



Fig Bogen

Dargestellt ist ein Bogen der Länge k.
Gegeben sei ein fm Graph G mit Färbungsschema FS(G). Der Bogen wird wie dargestellt an G angeschlossen.
Wir betrachten einen Block zu einem Element der Spalte von E_1:

E_1	E_2	E_3
		1
	2	
		4
1		
		1
	4	
		2

Wir zeigen nun die FS zu den Graphen, die wir erhalten indem wir die Ecken des Bogens der Reihe nach anschliessen, also G + E_{b_1}, G + E_{b_1} + E_{b_2}, ...

E_1	E_{b_1}	E_2	E_3	als Liste			
	3		1	1	3	2	1
		2		1	4	2	1
	4		4	1	3	2	4
				1	4	2	4
1				1	3	4	1
	3		1	1	2	4	1
		4		1	3	4	2
	2		2	1	2	4	2

Nach dem Anschluß der zweiten Ecke des Bogens haben wir als FS

E_1	E_{b_1}	E_{b_2}	E_2	E_3
		1		
	3			1
		4		
			2	
		1		
	4			4
		3		
1				
		...		
			...	
		...		

Die Darstellung der unteren Hälfte können wir uns sparen (vertausche 2 und 4).

	1			
3			1	
	1			
4				
	3			
		2		
	1			
3				
	4			
	1			
4			4	
	3			
1				

Zwischen den Spalten von E_1 und E_2 sehen wir jetzt ein "ganz normales" FS, sozusagen ein lokales FS, wobei die Ecken E_1 und E_2 mit ihren Farben die analoge Rolle spielen wie die Farben der Ecken E_2 und E_3 der Basisseite.

Interessant wird der Anschluß der letzten Ecke des Bogens, da für diese die zulässigen Farben von den Farben von drei Ecken abhängen. Wir erhalten - wie zu erwarten - gekoppelte Spalten.

Die behauptete Anzahl auf dem Rand verschiedener Färbungen ist gegeben.
Es handelt sich gemäß Konstruktion um lauter zulässige Färbungen.

In diesem FS kommen als Blöcke nicht nur die bekannten Typen vor. Solche FS würden den weiteren Beweis komplizierter machen, deshalb erfolgt der Anschluß eines Bogens nur wenn die Ecken des Bogens auf dem Rand des letztendlich zu färbenden Graphen G liegen, d.h. wenn keine Ecke des Bogens durch den Anschluß weiterer Ecken nach innen fällt.

Bemerkung:
Natürlich ist ein Bogen ein Rad mit E_2 als Nabe. Die Färbungen für E_2 stehen aber schon fest. Um statt des Bogens ein Rad mit E_2 als Nabe anschließen zu können, müßte man die Konstruktion des Graphen zum Teil rückgängig machen (soweit, daß E_2 noch nicht angeschlossen ist), dies möchten wir vermeiden.

Bei mehreren Bögen auf dem Rand gibt es nichts prinzipiell Neues wenn sich die Bögen nicht überlappen.



Im dritten Beispiel überlappen sich zwei Bögen. Auch hier können wir die behaupteten Färbungen konstruieren:

E_1	E_4	E_5	E_2	E_3	E_1	E_4	E_5	E_6	E_7	E_3
		1					1	4, 3		
	3			1		3				1
		4					4	3		
			2							
		1					1	3		
	4			4		4				4
		3					3	1		
1					1					
		2					2	3		
	3			1		3				1
		1					1	2, 3		
			4							
		2					2	3, 1		
	1			2		1				2
		3					3	1		

Die Spalte für E_7 überlassen wir dem Leser. (Danke)

Das FS wird wieder kompliziert und diese Konstruktion wird nur verwendet, wenn die Ecken der Bögen auf dem Rand (von G) bleiben. (Wenn sie durch weitere Anschlüsse nach innen fallen ist der Anschluß eines Rades möglich.)

5. Anschluß Ecke Grad k



Dargestellt ist eine Ecke E^*, die durch Kanten mit k Ecken eines fm Graphen verbunden wird.

Es interessiert nur $k \geq 3$; der Fall $k = 2$ ist der Anfang eines Bogens.

Dieser Anschluß ist nur zu betrachten für den Fall, daß E^* auf dem Rand des zu färbenden Graphen liegt, d.h. nicht nach weiteren Anschlüssen nach innen fällt.

Wir betrachten das FS(G), und zwar die drei Spalten zu den Ecken E_1, E_2, E_3, davon einen Block. Für alle anderen Blöcke verläuft die Konstruktion der Färbungen analog.

Im allgemeinen sind die Spalten der Ecken E_1 usw. länger, aber alle Blöcke zu jeweils 4 Färbungen sehen im Prinzip gleich aus.

E_1	E_2	E_3		E_1	E^*	E_3
		1			4, 3	1
	2					
		4			3	4
1			wird zu	1		
		1			2, 3	1
	4					
		2			3	2

E^* hat also die gleiche Länge wie E_3. In der Spalte jeder weiteren Ecke $(E_4, \ldots, E_k)$, die mit E^* verbunden wird, werden die Farben, die wegen der jeweiligen Farbe von E^* nicht zulässig (da gleich) sind, gestrichen, also maximal jede zweite. Dadurch hat diese Ecke dann die Länge von E^* und dabei fallen $E_4, \ldots, E_{k-1}$, nach innen. Wir haben schließlich die behaupteten Färbungen (mindestens) für den Rand von $G + E^*$ mit zwei gekoppelten (d. h. gleich langen) Spalten für E^*, E_k.

Bemerkung: Obiges FS in der Mitte legt es nahe für $f(E^*) = 3$ zu wählen und zu zeigen, daß es die behauptete Anzahl auf dem Rand von $G + E^*$ sich unterscheidende Färbungen gibt. Dies ist aber nicht unbedingt richtig: Zeile 1 und Zeile 3 sind mit dieser Färbung für E^* (zunächst lokal) gleich und daher kann es Färbungen geben, die auf dem ganzen Rand von $G + E^*$ gleich sind.



Fig Kante

Gegeben sei ein fm Graph G mit Färbungsschema FS. Eine Kante K werde angefügt. Damit G’ = G + K fm ist, muß K eine Ecke des Randes von G mit der übernächsten verbinden. Eine Kante von E_1 nach E_4 ohne die eingezeichnete Kante gibt einen Graph, der nicht fm ist.

Wir betrachten den Fall, daß beim Anschluß von K keine gekoppelte Spalte nach innen fällt. Das FS von G

E_1	E_2	E_3	
		1	<
	2		
		4	<
1			
		1	<
	4		
		2	<

wird zum FS von G’

E_1	E_3	
	4	<
1		
	2	<

Dabei deuten die < die Fortsetzung des FS an, d.h. die weiteren Spalten, an denen sich nichts ändert.

Die Spalte von E_2, Spalte zwei im FS(G), taucht im FS(G’) nicht mehr auf, da die Ecke nach innen fällt. In der dritten Spalte von FS(G) fallen die Färbungen mit "1" weg, da sie jetzt unzulässig sind, d.h. die Anzahl der Färbungen halbiert sich.

Nun betrachten wir den Fall, daß beim Anschluß von K eine gekoppelte Spalte nach innen fällt. Dazu betrachten wir die FS(R5) und FS(R6), Abschnitt 5. Färbungen Räder. (Eckennumerierung nicht die der Fig Kante.)

E_1	E_2	E_4	E_5	E_6
			2	4
		1		
			4	2
1	2			
			2	4
		4		
			1	2, 4

Die Kante verbinde nun E_4 mit E_6. Wir erhalten als FS:

E_1	E_2	E_4	E_6
		1	4, 2
1	2		
		4	2

Entsprechend für R6 mit der Kante von E_5 nach E_7:

E_1	E_2	E_4	E_5	E_6	E_7
				1	4, 2
			2		
				4	2
		1			
				1	2, 4
			4		
				2	4
1	2				
				4	2
			2		
				1	4, 2
		4			
				4	2
			1		
				2	4

Wir erhalten das FS:

E_1	E_2	E_4	E_5	E_7
			2	4
		1		
			4	2

1	2			
			2	4
		4		
			1	2, 4

Wir erhalten also wieder ein FS mit gekoppelten Spalten. Der Länge des Randes ist um eins kleiner und die Anzahl der Färbungen ist halbiert.

Tatsächlich haben uns nur die Blöcke interessiert. Das Ergebnis ist, daß wir - nach dem Anschluß der Kante - wieder ein FS haben in dem nur die bekannten Blöcke vorkommen.

11. Spezialfälle

Einfache Beispiele zeigen, daß nicht alle plättbare Graphen zu K gehören. Wir betrachten Beispiele.

Beispiel 1



Es seien $G_l \in K$ und $G_r \in K$, mit einer gemeinsamen Ecke bilden sie G (G ist kein i-Graph). Mit $g = \gamma(G), g_l = \gamma(G_l), g_r = \gamma(G_r)$ ist $g = g_l + g_r$ - 1. Die Anzahl der Färbungen für G, die sich auf dem Rand von G unterscheiden, ergibt sich zu

$2^{g_l-3} * 2^{g_r-3} * 3! > 2^{g_l+g_r-1+3} = 2^{g-3}$

da wir drei Farben auf G_l unabhängig von den Farben von G_r permutieren können; eine Farbe ist durch die gemeinsame Ecke definiert.

Beispiel 2



Es seien $G_l \in K$ und $G_r \in K$, mit zwei gemeinsamen Ecke bilden sie G (G ist kein i-Graph). Mit $g = \gamma(G), g_l = \gamma(G_l), g_r = \gamma(G_r)$ ist $g = g_l + g_r$ - 2. Die Anzahl der Färbungen ist analog

$2^{g_l-3} * 2^{g_r-3} * 2 = 2^{g_l+g_r-2-3} = 2^{g-3}$.

da wir zwei Farben auf G_l unabhängig von den Farben von G_r permutieren können. Zwei Farben sind durch die gemeinsamen Ecken definiert.

Die Graphen G in Beispiel 1 bzw. 2 haben eine trennende Eckenmenge [W, 72], mit 1 bzw. 2 Ecken, (deshalb kein i-Graph.) Die Färbungen unterscheiden sich auf dem Rand von G, sind aber nicht zu einem FS geordnet.

Weitere Beispiele

Beispiel 3



Es seien $G_l \in K$ und $G_r \in K$ mit FS, G wie abgebildet, G ist kein i-Graph. (Es ist nicht $G = G_l + G_r$ im Sinne unserer Definition für "+".) Mit $g = \gamma(G), g_l = \gamma(G_l), g_r = \gamma(G_r)$ ist $g = g_l + g_r$. Die Anzahl der Färbungen für G ergibt sich zu

$2^{g_l-3} * 2^{g_r-3} * 2 * 3! > 2^{g_l+g_3-6} * 2^3 = 2^{g-3}$ folgender maßen:

für E_{r_3} sind zwei Farben möglich: $f(E_{r3}) \neq f(E_{l2}), f(E_{r3}) \neq f(E_{l3})$, die drei anderen Farben können wir auf G_r permutieren unabhängig von den Färbungen von G_l.

Beispiel 4



Es seien $G_l \in K$ und $G_r \in K$ mit FS, mit zwei gemeinsamen Ecke bilden sie G (G ist kein i-Graph). Mit $g = \gamma(G), g_l = \gamma(G_l), g_r = \gamma(G_r)$ ist $g = g_l + g_r$. Die Anzahl der Färbungen ist

$2^{g_l-3} * 2^{g_r-3} * 2 * 2 * 2 = 2^{g-3}$.

Für E_{r_2} sind zwei Farben möglich ($\neq f(E_{l2}), \neq f(E_{l3})$), dann sind für E_{r3} wiederum zwei Farben möglich ($\neq f(E_{r2}), \neq f(E_{l3})$), und dann können wir die zwei Farben verschieden von $f(E_{r2}), f(E_{r3})$ auf E_r permutieren.

Epilog

Diese Arbeit wurde bereits verschiedentlich veröffentlicht.

1. Im Jahre 1971 lag sie Prof. W. Jurkat vor während seines Aufenthaltes in Ulm, Abt. Mathematik I, Prof. A. Peyerimhoff.

2. Gedruckt als Technischer Bericht des Rechenzentrums der Universität Ulm.

3. Vortrag bei der Tagung Graphentheorie am Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach im Juli 1975.

Ulm, August 2003

Lorenz Friess
Isnyerstr. 14
D-89079 Ulm
www.lorenz-friess.de